نشرة معهد علوم البحر وتهيئة السواحل

PELAGOS



Bulletin de l'Institut des Sciences de
la Mer et de l'Aménagement du Littoral

NUMERO SPECIAL

"Poissons des Côtes Algériennes"

1993

MINISTERE DELEGUE AUX UNIVERSITES ET A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PELAGOS, Bulletin de l'ISMAL (Institut des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral), s'obtient par échange d'une revue océanographique ou limnologique ou séparata reches annuels, soit par abonnement.
Les abonnements comprennent l'ensemble des livraisons de l'année en cours.
Pour tout renseignement s'adresser à : ISMAL.
Service Documentation.
BP.90 Alger, 1er Novembre - ALGER -.

نشرة معهد علوم البحر وتهيئة السواحل

PELAGOS



Bulletin de l'Institut des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral

NUMERO SPECIAL

"Poissons des Côtes Algériennes"

1993

MINISTERE DELEGUE AUX UNIVERSITES ET A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

POISSONS DES COTES ALGERIENNES.

PAR

Farid DJABALI
Boualem BRAHMI
Madani MAMMASSE

ISMAL – BP 90 ALGER 1er NOVEMBRE – ALGER –

AVANT PROPOS

Le naturaliste quasi universel qu'était Jean-Henri Fabre n'avait guèxé d'affinité pour la Taxonomie qui, pour lui, était une science morte. Ce grand entomologiste initiateur de disciplines modernes telles que l'Ethologie ou l'Ecologie préférait passer ses journées en pleine nature à observer les mœurs des insectes plutôt que de les classer et de les mettres en boîte dans le clair-obscur de son cabinet de travail.

Cependant, cet observateur remarquable auteur non seulement des "Souvenirs entomologiques" mais de nombreux ouvrages sur la Botanique, la Zoologie, la Cosmographie, les Sciences de la Terre, la Physique et la Chimie, ce dessinateur de talent qui nous a laissé des planches remarquables, en particulier sur les champignons, avait parfaitement réalisé l'importance d'une connaissance parfaite des espèces. Sans cette connaissance, estimit-il, aucune recherche sur la vie et les mœurs des animaux ne peut être considerée comme sûre.

On comprent ainsi pourquoi Fabre avait autant d'admiration pour le grand systématicien qu'était Latreille. Lui même n'a-t'il pas créé plusieurs espèces d'insectes nouvelles pour la science !

Cette nécessité qu'il y a d'être certain d'une détermination est également applicable à toutes les sciences de la vie même et peut être surtout dans leurs applications. Il en est ainsi pour les sciences de la Mer en général et pour l'Halieutique en particulier. En effet comment estimer sans erreur l'importance d'un stock et son devenir si l'on ne sait d'une manière précise à quelle espèce ou sous-espèce il appartient. Les confusions en matière d'Ichthyologie ou de Malacologie ne sont pas rares surtout si l'on perd la notion d'étude "in situ" tant prisée par Fabre. Ces confusions ont été et peuvent être encore à l'origine de conclusions erronées qui ont des conséquences non négligeables dans la gestion des ressources marines vivantes.

D'ailleurs ce ne sont par seulement les chercheurs et les techniciens qui doivent chercher à éviter ce genre d'erreur ; en effet, dans bien des cas, une connaissance sûre des espèces peut être d'une grande utilité pour les professionels de la pêche, l'observation et la connaissance du comportement de telle ou telle espèce de poisson ou de crustacé pouvant leur permettre d'améliorer leurs performances tout en veillant à la conservation des stocks.

Pour permettre à ceux qui ne sont pas des naturalistes chevronnés d'acquérir le moyen d'éviter des erreurs regrétables, point n'est

besoin de disposer d'ouvrages complets et compliqués que seuls des spécialistes peuvent utiliser avec profit. Il leur faut un ouvrage clair, simple bien adapté à leur région, à leur secteur géographique permettant de differencier des espèces voisines qui habitent ou cohabitent dans leurs lieux de pêche.

Cela, monsieur Djabali et ses collaborateurs le mettent à la dispostion des chercheurs, techniciens ou professionnels d'Algérie. Ils doivent en être felicités et remerciés. Puisse cet ouvrage modeste mais utile être apprécié et jouer pleinement son rôle qui est de faire avancer la connaissance pratique des poissons. Je leur souhaite, comme ils le méritent une heureuse carrière.

Claude MAURIN
Directeur Honoraire de l'Institut
Français des Pêches Maritimes. (ISTPM).

"A tous ceux qui aiment et respectent la mer."

"A nos amis pêcheurs."

Remerciements

Nous tenons à remercier tout d'abord le Professeur C. MAURIN pour ses conseils et les informations dont il nous a fait part gracieusement.

Nos remerciements s'adressent aussi à Messieurs TOUATI et REZZOUG (armateurs à Béjaîa), MM Azzedine BELHADJ, Slimane ALLA, Mouloud HAMLAOUI (armateurs à Annaba) et les équipages des chalutiers "ITHRI" et "MAHER", ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont de près ou de loin aidé à la réalisation de cet ouvrage, spécialement les ingénieurs halieutes stagiaires de l'ISMAL cités en référence, et MM. D.E ALILI et O. CHERABI de l'USTHB.

SOMMAIRE

Introduction **10**
Glossaire **11**
Abréviations utilisées **20**
Morphologie externe des poissons osseux **21**
Morphologie externe des poissons plats **22**
Localisation des régions étudiées **23**
Systématique, biologie, écologie et description des espèces **24**
Index des noms scientifiques **188**
Index des familles et espèces **193**
Index des noms F.A.O. **197**
Index des noms locaux **200**
Correspondance Noms F.A.O. - Noms locaux **205**
Bibliographie **212**

Introduction

Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Biologie ainsi qu'à toute personne voulant se documenter sur les espèces de poissons osseux les plus fréquemment capturés par les divers engins de pêche utilisés en Algérie.

Ainsi, 164 espèces ont été retenues et classées par ordre alphabétique de famille pour lesquels en plus de l'aspect général de morphologie externe et des caractères de reconnaissance (indiqués par une flèche) nous avons recueillis divers renseignements portant sur la systématique (synonymie, noms FAO, noms locaux pour les régions de Ghazaouet (Gh), Bénisaf (BS), Oran (Or), Bou-Haroun (BH), Alger (Al), Béjaia (B), Annaba (An) et d'El-Kala (K)), la biologie (sexualité, période de reproduction, taille maximale), l'écologie (régime alimentaire, habitat, distribution régionale sur les côtes algériennes et la pêche (engins de capture). Par ailleurs, lorsque cela était possible, nous avons donné la formule radiaire de l'espèce, celle-ci pouvant être formulée selon les trois types possibles suivants :

Anthias anthias (Anthiidae)

D X-XI, 15 ; A III, 7-8., soit dix à onze rayons durs et quinze rayons mous à la nageoire dorsale ; trois rayons durs et sept à huit rayons mous à la nageoire anale.

Gadiculus argenteus argenteus (Gadidae)

D1 9-13, D2 14-17, D3 15-18 ; Al 15-19 ; A2 15-19., Soit : neuf à treize rayons mous à la première nageoire dorsale quatorze à dix-sept rayons mous à la deuxième nageoire dorsale et quinze à dix-huit rayons mous à la troisième nageoire dorsale et quinze à dix-neuf rayons à la première nageoire anale et quinze et dix-neuf à la deuxième nageoire anale.

Auxis rochei (Scombridae)

D1 X-XI, D2 11-12 + 7-9 ; A 12-15 + 7-8., soit dix à onze rayons durs à la première nageoire dorsale, onze à douze rayons mous à la deuxième nageoire dorsale et sept à neuf pinnules dorsalement avant la caudale ; et douze à quinze rayons mous à l'anale et sept à huit pinnules ventralement avant la caudale.

GLOSSAIRE

Abyssal	: qui vit dans les profondeurs océaniques en dessous de 2500 mètres environ.
Adipeuse (Nageoire)	: qui a les caractères de la graisse ou qui en contient.
Algues	: végétaux aquatiques, pratiques comme les plantes terrestres, l'assimilation chlorophyllienne par photosynthèse. On distingue : les algues bleues, les algues brunes, les algues rouges et les algues vertes.
Amphipodes	: groupe de Crustacés, dont le corps est comprimé latéralement, sans carapace, des yeux sessiles, leur segment thoracique antérieur fusionne avec la tête et une post-paire de pattes mâchoires.
Anadrome	: poisson qui vit en mer et monte frayer en eau douce (alose, saumon).
Annelides	: groupe zoologique de vers.
Argileux	: fonds dont les constituants sédimentaires sont trés fins (fractions pélitiques ou vase).
Barrage	: retenue artificielle d'eau.
Bathyal	: région des océans correspondant au talus continental de 200 à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, c'est-à-dire correspondant au large aux zones méso et bathypélagique. Toute végétation y est absente.
Bathypélagique	: région océanique de pleine eau situé entre 600 et 2000 à 3000 mètres de profondeur, la température oscille entre 4° et 10°C.
Benthique	: qui vit sur les fonds d'eau douce ou marine (invertébrés, poissons), ou dans leur voisinage immédiat.
Benthopélagique	: organisme à la fois benthique (vivant près du fond) et pélagique (en pleine eau).

Bivalve	: mollusque à symétrie bilatérale, caractérisé par l'existence d'une coquille formée de 2 valves qui renferme le corps.
Bonitière	: filet fixe destiné à la capture des bonites. Il est composé de 2 à 3 pièces. Chaque pièce est formée d'une nappe de 150 mètres de longueur avec une maille de 40 à 50 mm de côté et de 18 à 20 mètres de hauteur.
Branchiospines	: épines plus ou moins fortes situées sur la partie supérieure de l'arc branchial (encore appelées brachycténies).
Broyeur	: qui broie les aliments.
Broyozoaire	: organisme marin qui vit dans des logettes et forme des colonies généralement fixées à un substrat dur.
Carène	: excroissance située sur un organe ou une région du corps : carène dorsale chez les crustacés, carène ventrale ou latérale (scutelles) ou encore située sur le pédoncule caudal chez les poissons (thons).
Carnivore	: dont le régime alimentaire est à base animale.
Catadrome	: espèce qui vit en rivière et se reproduit en mer (anguille).
Céphalopode	: groupe de Mollusques dont le corps se prolonge sur la tête en tentacules (poulpes, sépias et calmars).
Chalut	: grande poche de filet trainée et tenue ouverte soit par une perche à patin, soit par des panneaux.
Coelentérés	: ou Cnidaires, Métazoaires diploblastiques à symétrie radiaire, la cavité digestive, simple ou cloisonnée ne possèdant qu'un seul orifice.
Croc	: canine forte, longue et pointue.
Crustacés	: comprend divers groupes d'invertébrés, munis d'antennes, à respiration branchiale.

Crustacés Décapodes : groupe de Crustacés les plus évolués, à 5 pattes sur les cinq derniers segments thoraciques ; leur "queue" ou partie abdominale peut être développée et protégée (Macroures) ; les uns sont marcheurs (langouste, homard....) d'autres nageurs (crevettes, etc...) ; d'autres ont la queue asymétrique et non protégée (Bernard l'ermite).

Démersal : définition donnée par la FAO aux espèces vivant sur le fond ou à proximité du fond, généralement capturées à l'aide des chaluts classiques.

Détritus : débris organiques.

Dimorphisme : propriété pour une espèce de présenter deux formes différant par la morphologie externe ; cet différence est souvent liée au sexe.

Dichromisme : propriété pour une espèce de présenter deux formes différant par leur coloration.

Echinodermes : groupe d'invertébrés à symétrie rayonnée, comprenant entre autres les oursins, les étoiles de mer.

Epervier : nappes de filet circulaire, formé d'une nappe interne à petite maille et d'une nappe externe à grande maille. Ce filet est monté sur une seule ralingue fortement plombée. La partie supérieure du filet est ramassée sur un seul point ou anneau. L'engin est jeté sur un banc de poisson se trouvant en surface ou à faible profondeur.

Epipélagique : zone océanique superficielle de pleine eau, de profondeur comprise entre 0 et 250 m ; les rayons lumineux y pénètrent ce qui permet le développement de plancton végétal ou d'algues non fixées.

Estuaire : partie aval du lit d'une rivière envahie par la mer.

Euphausiacés : Crustacés décapodes nageurs appartenant au domaine pélagique, ont une allure de crevettes mais la carapace n'enveloppe pas parfaitement les côtés du thorax et laisse voir les branchies (caractère primitif).

Filet maillant : filet formé d'une nappe simple double ou triple (trémail). Plusieurs types de filets peuvent être combinés en un seul engin. On peut utiliser ce filet soit seul soit combiné. Le poisson est maillé ou emmêlé.

Fond détritique : fond de débris organiques ou minéraux.

Fond meuble : fond de sable ou de vase.

Formule radiaire : formule donnant le nombre de rayons des nageoires.

Gastéropode : Mollusque dont le pied ventral est locomoteur, coquille généralement univalvaire, exceptionnellement bivalvaire, parfois absente.

Gonochorique : dont les sexes sont portés par des individus différents (espèces à sexe séparé). C'est le contraire des hermaphrodites.

Graveleux : mêlé de gravier.

Gravier : petits cailloux plus ou moins mêlés de sable grossier.

Grégaire : organismes qui vivent en groupes, en colonies ou en bancs.

Harpon : appelé aussi fusil harpon ou fusil à arbalète ; c'est un engin de pêche par blessure. Il s'agit de tuer, blesser ou crocher le poisson.

Herbier : prairie sous-marine constituée d'algues ou de phanérogames (zostères ou posidonies).

Herbivore : dont le régime alimentaire est à base végétale.

Hermaphrodite	: particularité des êtres qui peuvent produire en même temps des gamètes de l'un ou de l'autre sexe.
Hermaphrodite potentiel	: lorsqu'un des territoires sexuels reste rudimentaire et latent toute la vie.
Hermaphrodite protandre	: voir protandrique.
Hermaphrodite protogynique	: voir protogynique.
Hemaphrodite rudimentaire	: hermaphrodisme peu développé.
Hermaphrodite synchrone	: dont les deux sexes s'accomplissent ou évoluent en même temps.
Homard	: Crustacé Décapode marcheur.
Hydrozoaires	: Cnidaires (ou Coelentérés), présentant généralement une phase polype et une phase méduse.
Ile	: étendue de terre entourée d'eau de tous côtés.
Infère	: qui est situé en dessous. S'emploie pour la position de l'ouverture buccale quant elle n'est pas terminale mais ventrale, située sous le museau.
Invertébrés	: animaux sans colonne vertébrale.
Lagune	: étang littoral en communication avec le mer.
Larve	: forme qu'affectent certains animaux aux cours de la première phase de leur développement pendant laquelle ils différent de l'adulte.
Ligne à main	: est l'engin pêchant du praticien, elle se compose d'une bannière, d'un bas de ligne et d'un hameçon. Elle peut avoir ou non un flotteur et une plombée.
Maturité	: état de plein développement.

Mandibule : mâchoire inférieure.

Méduse : Cnidaires dont l'ectoderme contient des cellules spécialisées dans la défense.

Mésentère : long repli du péritoine qui relie l'intestin à la paroi.

Mésopélagique : zone de pleine eau située entre 100 à 200 mètres de profondeur qui est encore légérement éclairée, mais seules certaines formes de plancton végétal peuvent y survivre.

Migration : déplacement cyclique, se fait le plus souvent en groupe.

Mollusque : groupe d'invertébrés à symétrie bilatérale. Corps mou, généralement non segmenté, constitué de trois parties : tête, pied musculeux, masse viscérale enveloppée par le manteau.

Moule : mollusque bivalve, à symétrie bilatérale, pourvue d'une coquille à valves.

Mucus : humeur visqueuse sécrétée par les glandes des muqueuses.

Muqueuse : membrane tapissant des cavités ou des conduits du corps ayant un orifice à l'extérieur.

Muqueux : qui produit du mucus.

Mysidacés : Crustacés pélagiques à allure de crevettes, mais leur carapace n'est soudée qu'aux trois premiers segments thoraciques.

Nasses : engins de pêche. En fonction de leur utilisation, elles sont sphériques, plus ou moins aplatie ou en forme de cônes ou de cylindres ou encore de polygone. Une nasse comporte plusieurs ouvertures : une ou deux ouvertures en forme d'entonnoir par lequel entrent les poissons, une ouverture pourvue d'une petite porte pour les retrait du poisson capturé.

Nectonique	: qui vit à une certaine distance au dessus du fond.
Nictitante (membrane)	: à fonction de paupière.
Océanique	: qui appartient à l'océan.
Oculé	: partie du corps qui porte les yeux ou des tâches en forme d'œil.
Oiseaux marins	: oiseaux dont le biotope est le milieu marin de la frange littorale à la haute mer.
Omnivore	: organisme qui mange de tout.
Opercule	: volet recouvrant les branchies chez les poissons osseux.
Ophiure	: Echinoderme constitué d'un disque central, nettement séparé des bras, qui ne contient aucun organe, pas d'anus.
Oursin	: Echinoderme dont le corps globuleux est parfois aplati. Plaques dermiques juxtaposées constituant un test et présentant des piquants.
Palangres	: sont des petits engins de pêche formés de lignes et d'hameçons ; ils se différencient entre eux par leur longueur, la force des parties qui les composent, selon la profondeur des fonds de calaisons, l'espèce et la grosseur des poissons.
Pélagique	: qui vit en pleins eau, libre de tout contact avec le fond.
Pinnule	: petites nageoires, soutenues par un seul rayon plus ou moins ramifié.
Plancton	: ensemble des organismes microscopiques vivant et flottant dans l'eau passivement ou non, sans toutefois opposer de résistance effective au courant.
Planctonophage	: dont le régime alimentaire est principalement planctonique.

Plateau continental	: prolongement du continent sous la mer à une profondeur déterminée, limitée par une rupture de pente (on dit aussi plate-forme continentale).
Polychète	: Annélides pourvues de soies nombreuses fixées sur les parapodes.
Posidonies	: plantes marines, phanérogames, à feuilles larges vivant sur les fonds de sable où elles forment des prairies.
Prairie de posidonies	: voir posidonies.
Prairie sous-marine	: voir herbier.
Prédateur	: qui se nourrit d'une autre espèce, en générale plus petite.
Progynique ou protérogynique	cas d'hermaphrodisme où les gamètes : femelles sont mûrs avant les gamètes mâles.
Protandrique	: cas d'hermaphrodisme où les gamètes mâles sont mûrs avant les gamètes femelles.
Protractile	: se dit d'un organe articulé suceptible d'être projeté en avant, par exemple la bouche dont l'articulation squelettique est telle que son ouverture fait saillir les mâchoires vers l'avant jusqu'à la rendre tubuleuse.
Rostre	: éperon situé en prolongement de la tête notamment chez certains crustacés ou poissons.
Sableux	: fond constitué de sable.
Sablo-vaseux	: fond constitué d'un mélange de sable et de vase.
Saisonnier	: dépendant des saisons.
Saumâtre	: indique une salure intermédiaire entre celle de l'eau douce et de la mer. Selon le degré de salure on distingue : des eaux "oligohalines" (faiblement saumâtres), "mésohalines" (moyennement saumâtres), "polyhalines" (fortement halines).

Scutelle	: écaille de grande taille, souvent très ossifiée, latérale ou ventrale, rarement dorsale.
Senne	: grande nappe de filet allongée permettant d'encercler les poissons, elle peut être tirée en raclant le fond, soit à partir d'une plage (senne de plage), soit d'un bateau (senne danoise) ou manœuvrée en pleine eau (senne tournante ou coulissante).
Talus continental	: prolongement en pente du plateau continental.
Traine	: Pêche s'effectuant en remorquant une ou plusieurs lignes derrière le bateau.
Trémail	: engin de pêche fixe, composé de trois nappes de filets (trois mailles). On distingue : vers l'extérieur deux nappes identiques à grandes mailles appelées "tables" ou "pareds" et entre ces deux nappes, une nappe intermédiaire à mailles plus petites appelée "voile", prévue avec beaucoup de flou en hauteur.
Vaseux	: fond constitué de vase.
Vase	: boue qui se dépose au fond des eaux.
Villosité	: petit repli de la peau, rugosité ou saillie qui recouvre certaines surfaces à l'extérieur ou à l'intérieur du corps, augmentant considérablement la surface d'échanges.
Zooplancton	: plancton animal, il est composé d'animaux très divers parmi lesquels de nombreux petits Crustacés (Copépodes).
Zooplanctonophage	: dont le régime alimentaire est principalement zooplanctonique.

ABREVIATIONS UTILISEES

A	**: Nageoire anale**
A1	**: Première nageoire anale**
A2	**: Deuxième nageoire anale**
Al	**: Alger**
An	**: Annaba**
B	**: Béjaia**
BH	**: Bou-Haroun**
BS	**: Béni-Saf**
C	**: Centre algérien**
D	**: Nageoire dorsale**
D1	**: Première nageoire dorsale**
D2	**: Deuxième nageoire dorsale**
D3	**: Troisième nageoire dorsale**
E	**: Est algérien**
Gh	**: Ghazaouet**
j-i	**: jeunes individus**
K	**: El-Kala**
LF	**: Longueur à la fourche**
O	**: Ouest algérien**
Or	**: Oran**
S-Sp	**: Sous-espèce**



Morphologie externe des Poissons osseux.



Soléidé : (face oculée)



Bothidé: (face oculée)

Morphologie externe des Poissons plats.



LOCALISATION des REGIONS ETUDIEES -

Famille : ANGUILLIDAE

Espèce : Anguilla anguilla (Linné, 1758).
Synonymes : – Anguilla vulgaris Shaw, 1803.

Nom F.A.O : Anguille d'Europe.
Noms locaux : Selbah ; Anguille (Al) ; Tasselbahth (B) ; Hnech, Anguille (BH).
Taille maximale : 150 cm. Commun : 80 cm (femelles) ; 40 cm (mâles).
Engins de capture : Lignes ; nasses ; éperviers ; verveux.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps en mer des Sargasses (Atlantique).
Régime alimentaire : Omnivore.
Habitat : Catadrome.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps allongé serpentiforme et recouvert de mucus.
– Coloration variable selon la maturité, généralement gris-verdâtre lors de la migration, ventre blanc jaunâtre.
– Tête comprise dans deux fois et demi la distance séparant l'extrémité du museau de l'origine de la dorsale.
– Mandibule plus avancée que la machoire supérieure.
– Ligne latérale bien marquée.
– Dorsale, caudale et anale continues.

Famille : ANTHIIDAE

Espèce : Anthias anthias (Linné, 1758).
Synonymes : – Anthias sacer Bloch, 1792.

Nom F.A.O : Castagnole.
Noms locaux : Serdouk ; coq (B).
Taille maximale : 25 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite progynique.
Période de reproduction : Printemps-Eté.
Régime alimentaire : Crustacés et petits poissons.
Habitat : Fonds rocheux.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D X-XI, 15 ; A III, 7-8



Description :

– Coloration rose vif avec des bandes jaunes sur les joues.
– Poisson épineux.
– Troisième rayon de la dorsale bien développé, ventrale longue.
– Lobe inférieur de la caudale plus long que le supérieur.

Famille : ANTHIIDAE

Espèce : Callanthias ruber (Rafinesque, 1810).
Synonymes : – Lepimphis ruber Rafinesque, 1810.
– Anthias buphthalmus Bonaparte, 1833.

Nom F.A.O : Barbier – perroquet.
Noms locaux : Serdouk ; coq (B).
Taille maximale : 25 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite progynique.
Période de reproduction : Décembre – janvier.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Fonds rocheux ou durs, rarement vaseux, grottes (du plateau et du talus).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 10-11 ; A III, 9-10



Description :

– Coloration rose.
– Partie épineuse de la dorsale de hauteur régulièrement croissante.
– Lobe de la caudale aux extrémités enrubanées.
– Ventrale relativement courte.

Famille : ARGENTINIDAE

Espèce : Argentina sphyraena Linné, 1758.
Synonymes : – Argentina cuvieri Valenciennes, 1848.

Nom F.A.O : Argentine.
Noms locaux : Argentine (Al,K) ; Argentin (An).
Taille maximale : 30 cm. Commun : 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Hiver – Printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques et pélagiques ; poissons pélagiques.
Habitat : Vit sur la partie supérieure du talus (optimum 200-400 m) sur fonds vaseux.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 9-12 ; A 10-15.



Description :

– Coloration grisâtre au dessus de la ligne latérale formée d'écailles identiques à celles du corps ; flancs blanchâtres argentés.
– Œil bien développé.
– Première dorsale située au milieu du corps.
– Deuxième dorsale adipeuse.
– 7 à 10 branchiospines.

Famille : ATHERINIDAE

Espèce : Atherina boyeri Risso, 1810.
Synonymes : – Atherina mochon Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Joel.
Noms locaux : Atherine, La'aoun (Al) ; Colonel.
Taille maximale : 13 cm.
Engins de capture : Chaluts.
Période de reproduction : Printemps – été.
Régime alimentaire : Zooplancton.
Habitat : Côtière, fréquente les ports, les eaux saumâtres et lagunes.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VI-IX, D2 I-8-14 ; A I-11-17.



Description :

– Coloration gris-jaunâtre sur le dos et blanchâtre sur les flancs.
– Œil bien développé.
– Première dorsale légèrement arrondie.
– 39 à 49 écailles ; 40 à 47 vertèbres.

Espèce voisine : *A. hepsetus* Linné, 1758 ; pélagique et littoral, 59 à 65 écailles, 53 à 57 vertèbres.

Famille : BALISTIDAE

Espèce : Balistes carolinensis Gmelin, 1789.
Synonymes : – Balistes capriscus Gmelin, 1789.
– Balistes forcipatus Gmelin, 1789.

Nom F.A.O : Baliste-cabri.

Noms locaux : Cochon de mer, Halouf el bhar (Al) ; Halouf (Gh,BS) ; Cochon de mer (An,B,K) ; Hallouf, Cochon (BH).

Taille maximale : 45 cm ; commun 15 à 35 cm.

Engins de capture : Chaluts, filets maillants, lignes à main.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Eté.

Régime alimentaire : Invertébrés benthiques essentiellement mollusques et crustacés.

Habitat : Au-dessus des fonds côtiers, eaux tempérées chaudes. Fréquent en été surtout à l'est en Algérie.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 III , D2 26-29 ; A 23-28.



Description :

– Corps aplati latéralement, gris plus ou moins brunâtre, nageoires tâchetées de bleu ou de jaune.
– Peau d'allure "cuir".
– Forts rayons épineux à la première dorsale et à la pelvienne.
– Bouche terminée en bec, dents fortes et rapprochées.
– Parfois deux à trois bandes sombres sur le corps.

Famille : BELONIDAE

Espèce : Belone belone gracilis Lowe, 1839.
Synonymes : – Belone belone (Linné, 1761).
– Belone euxini Günther, 1866.

Nom F.A.O : Orphie.
Noms locaux : Spetone (BS) ; Boumekhiat (BH,AI,B) ; Aiguille (B) ; Sebta (Gh).
Taille maximale : 90 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; lignes ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Février – mai.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Epipélagique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 16-19 ; A 19-22.

Description :

– Corps très allongé, la bouche se terminant en rostre effilé.
– Une dorsale rejetée très en arrière du corps, proche de la caudale.
– Coloration gris-bleu très sombre sur le dos, ventre argenté, vertèbres vertes.
– 20 à 40 branchiospines.

Famille : BLENNIIDAE

Espèce : Blennius ocellaris Linné, 1758.
Synonymes : – Blennius lepus Lacepède, 1800.
– Adonis pavoninus Grononius, 1864.

Nom F.A.O : Blennie papillon.
Noms locaux : Belkhanzize (B) ; Goujon (An,K) ; Chadi (Al).
Taille maximale : 20 cm.
Engins de capture : Chaluts et filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Démersal sur fonds vaseux du plateau continental et du bord du talus de 30-40 m à 200-300 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII , 14-16 ; A II , 15-16.



Description :

– Grosse tête munie de deux lambeaux cutanés au dessus de l'œil.
– Corps trapu recouvert de mucus.
– Coloration brunâtre verdâtre avec de larges bandes verticales sombres.
– Dorsale à la partie antérieure développée en étendard avec un ocelle noir au tiers antérieur.

Famille : BOTHIDAE

Espèce : Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810).
Synonymes : – Bothus imperialis Rafinesque, 1810.
– Arnoglossus lophotes Günther, 1862.

Nom F.A.O : Arnoglosse impérial.
Noms locaux : Tapacoul (Al).
Taille maximale : 25 cm ; Commun : 8 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Petits poissons ; invertébrés.
Habitat : Benthique sur fonds sableux ou vaseux, herbiers du plateau continental (20-150 m, parfois plus).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 94-106 ; A 72-82.



Description :

– Corps applati dorso-ventralement (Poisson plat).
– Coloration grisâtre brunâtre tâchetée de brun.
– Yeux situés à gauche de la bouche.
– Deuxième au sixième rayon de la dorsale bien développés chez les mâles ; ce caractère demeure moins marquée chez les femelles.
– Ligne latérale absente sur la face sur laquelle repose l'espèce.

Famille : BOTHIDAE

Espèce : Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792).
Synonymes : – Pleuronectes laterna Walbaum, 1792.
– Pleuronectes conspersus Canestrini, 1861.

Nom F.A.O : Fausse limande.
Noms locaux : Tapacoul (Al).
Taille maximale : 20 cm ; Commune : 8 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à août.
Régime alimentaire : Invertébrés et petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux du plateau continental et de son bord, de la côte à la rupture de pente, rare au delà.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 82-98 ; A 63-75.



Description :

– Poisson plat.
– Yeux à gauche.
– Coloration blanc-crèmeux tâcheté de noir.
– Premiers rayons de la dorsale libres à l'extrémité pas plus longs que les suivants.
– Ligne latérale seulement sur la face oculée.

Famille : BOTHIDAE

Espèce : Arnoglossus thori (Kyle, 1813).
Synonymes : – Pleuronectes grohmanni (part) Bonaparte, 1837.
– Arnoglossus maltonii Torchio, 1961.

Nom F.A.O : Arnoglosse de Thor.
Noms locaux : Tapacoul (Al).
Taille maximale : 25 cm ; Commun de 8 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets mailiants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à août.
Régime alimentaire : Petits poissons et invertébrés.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux et sableux du plateau continental, assez côtier (optimum de 20 à 50 m, jusqu'à 100 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 81-93 ; A 61-69.



Description :

– Poisson plat.
– Yeux à gauche.
– Coloration sombre maculée de taches noires sur le corps et les nageoires ; une tâche foncée sur la fin de la courbure de la ligne latérale.
– Ligne latérale présente sur la face oculée seulement.
– Trois premiers rayons de la dorsale libres, le deuxième plus allongé chez les mâles adultes.

Famille : BOTHIDAE

Espèce : Bothus podas podas (Delaroche, 1809).
Synonymes : – Pleuronectes podas Delaroche, 1809.
– Rhombus podas Bonaparte, 1833.

Nom F.A.O : Rombou podas.
Noms locaux : Rumbo (Gh,BS) ; Hebo, Sole (B) ; Sole (An) ; Turbot (Al).
Taille maximale : 45 cm ; Commun : 8 à 18 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets mailiants ; lignes à main.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à août.
Régime alimentaire : Petits poissons et invertébrés.
Habitat : Benthique, côtier sur fonds à dominance sableuse jusqu'à – 50 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 85-84 ; A 63-73.



Description :

– Poisson plat.
– Yeux à gauche fortement écartés surtout chez le mâle.
– Coloration marron-nègre marbré, unie ou ocellée.
– Profil de la tête plus allongé chez les mâles.
– Petite pointe sur le maxillaire supérieur.

Famille : BRAMIDAE

Espèce : Brama brama (Bonnaterre, 1788).
Synonymes : – Brama raii (Bloch, 1791).
– Lepidotus catalonicus Asso y Del Rio, 1801.
– Lepodus saragus Rafinesque, 1810.

Nom F.A.O : Grande castagnole.
Noms locaux : Castagnole (Al,BH).
Taille maximale : 70 cm ; Commun : 30 à 50 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes ; traine.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Août à septembre.
Régime alimentaire : Petits poissons et invertébrés.
Habitat : Principalement mésopélagique, parfois nectonique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 35-38 ; A 29-32.



Description :

– Corps comprimé.
– Coloration sombre sur le corps, argentée sur les flancs.
– Dorsale et anale aux bordures sombres.
– Pelviennes et nageoires impaires foncées.
– Profil de la tête arrondi.
– Langue et palais noirs.

Famille : CALLIONYMIDAE

Espèce : Callionymus lyra Linné, 1758.
Synonymes : – Callionymus dracunculus Linné, 1758.
– Callionymus elegans Lesieur, 1814.

Nom F.A.O : Dragonnet lyre.
Noms locaux : Diable.
Taille maximale : 30 cm (mâles), 20 cm (femelles) ; Commun : 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Février à août.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds meubles de la côte jusqu'à 430 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IV , D2 9 ; A 8-9.



Description :

– Corps légèrement applati.
– Tête large.
– Première dorsale très développée avec le premier rayon plus long chez les mâles.
– Deuxième dorsale présentant des bandes longitudinales colorées en bleu et jaune.
– Gorge noirâtre.
– Colorations vives.

Famille : CALLIONYMIDAE

Espèce : Callionymus phaeton Günther, 1861.
Synonymes : – Synchiropus phaeton (Günther, 1861).
– Callionymus festivus Bonaparte, 1814.

Nom F.A.O : Dragonnet.
Noms locaux : Diablotin.
Taille maximale : 18 cm (mâles), 18 cm (femelles).
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Juin à septembre.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Fonds vaseux du talus continental (optimum de 200 à 500 m) ; surtout sur fonds à funiculines en association avec la crevette blanche (*Parapenaeus longirostris*).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IV , D2 8-11 ; A 8-9.



Description :

– Corps légèrement applati.
– Coloration orangée ou rosée avec des tâches plus foncées.
– Large tache noire entre les troisième et quatrième rayons de la première dorsale.
– Yeux bien développés.

Famille : CAPROIDAE

Espèce : Capros aper (Linné, 1758).
Synonymes : – Zeus aper Linné, 1758.
– Perca pusilla Brunnich, 1768.

Nom F.A.O : Sanglier.
Noms locaux : Tachaco (BS) ; Sanglier (Al.An) ; Pech-trompette (B) ; Poisson-trompette (K).
Taille maximale : 16 cm. Commun : 5 à 12 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps – Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés.
Habitat : Fréquente surtout les fonds de natures diverses (sableux, vaseux, plus rarement rocheux) du bord du plateau et de la partie supérieure du talus jusqu'à environ 500 m ; on peut cependant trouver les jeunes à partir de 50 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D IX-X , 22-24 ; A III , 22-23.



Description :

– Corps trapu.
– Bouche terminée en bec court, très protractile.
– Coloration rose-orangée, plus rouge chez les mâles.
– Premier rayon de la pelvienne fort et dentelé.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Campogramma glaycos (Lacépède, 1801).
Synonymes : – Lichia vadigo Cuvier, 1832.

Nom F.A.O : Liche lirio.
Noms locaux : Palomette.
Taille maximale : 75 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes ; palangres ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps-été.
Régime alimentaire : Petits poissons.
Habitat : Semi-pélagique et pélagique côtier, assez fréquent dans l'ouest algérien.
Distribution : O.
Formule radiaire : D1 VII, D2 I-26-28 ; A II-1-23-25.



Description :

– Coloration gris-vert sur le dos, ventre argenté, ligne séparant les deux ondulée surtout chez les jeunes.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Caranx crysos (Mitchill, 1815).
Synonymes : – Caranx fusus E. Geoffroy St-Hilaire, 1817.

Nom F.A.O : Carangue coubali.
Noms locaux : Néant
Taille maximale : 60 cm.
Engins de capture : Sennes ; filets maillants ; lignes ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Poissons ; invertébrés.
Habitat : Pélagique côtier, fréquente les eaux chaudes (en été en Algérie).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-VIII , D2 I 23-25 ; A II-I , 19-21.



Description :

- Corps massif et allongé ; profil de la tête plus ou moins bombé ; caudale fourchue.
- Scutelles sur la ligne latérale.
- Tache noire à l'arrière de l'opercule.
- Dos et flancs gris-bleu, ventre argenté.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Caranx hippos (Linné, 1766).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Carangue crevalle.
Noms locaux : Néant.
Taille maximale : 100 cm. Commun : 60 cm.
Engins de capture : Sennes ; filets maillants ; lignes ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Poissons ; invertébrés.
Habitat : Pélagique côtier, fréquente les eaux chaudes.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-VII-VIII , D2 I- 19-21 ; A I-II , 17-19.



Description :

- Corps massif.
- Profil de la tête très bombé et caudale très fourchue.
- Tache noire à l'arrière de l'opercule.
- Coloration gris-verdâtre sur le dos ; flancs jaunâtres, ventre argenté.
- Scutelles présentes seulement sur la partie postérieure de la ligne latérale.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Caranx rhonchus E. Geoffroy St-Hilaire, 1817.
Synonymes : – Decapterus rhonchus (E. Geoffroy St-Hilaire, 1817).
– Caranx angolensis Fowler, 1920.

Nom F.A.O : Comète coussut.
Noms locaux : Saurel.
Taille maximale : 60 cm ; Commun : 35 cm.
Engins de capture : Chaluts : sennes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Petits poissons et invertébrés.
Habitat : Côtier à comportement semi-pélagique, fréquente les eaux relativement chaudes ; fréquent en Algérie en été surtout dans l'est.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII , D2 I - 28-32 ; A II - I - 25-28.



Description :

– Corps allongé.
– Coloration gris-vert sur le dos, flancs plus ou moins dorés.
– Tache noire à la naissance de la deuxième dorsale.
– Scutelles présentes sur la ligne latérale et plus développés à la partie postérieure.
– Allure et comportement très semblables à ceux d'un saurel *(Trachurus)*.

Famille : CARANGIDAE

Espèce **:** Lichia amia (Linné, 1758).
Synonymes : – Centronotus vadigo Lacepède, 1801.
– Hypacanthus amia (Linné, 1758).
– Scomber amia Linné, 1758.

Nom F.A.O **:** Liche né-bé.
Noms locaux : Embouguade (jeune)-Licha (adulte (B) ; Liche (Al,BH) ; Liche (An) ; Lichola (Gh).
Taille maximale **:** 180 cm. Commun : 40 à 100 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes ; palangres ; harpons.
Sexualité **:** Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire **:** Poissons (Maquereaux, sardines).
Habitat **:** Pelagique côtier en eaux tempérées chaudes ; assez commun en Algérie.
Distribution **:** O-C-E.
Formule radiaire **:** D1 III-VI , D2 I - 19-21 ; A II , I 16-18.



Description :

– Corps massif, profil antérieur allongé.
– Coloration gris-sombre sur le dos, ventre argenté.
– Première dorsale formée de sept rayons durs très courts et séparés.
– Tache sombre sur la partie haute de la deuxième dorsale.
– Ligne latérale sinueuse.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Naucrates ductor (Linné, 1758).
Synonymes : – Naucrates fanfarus Rafinesque, 1810.
– Centronotus conductor Lacepède, 1801.

Nom F.A.O : Poisson pilote.
Noms locaux : Poisson pilote.
Taille maximale : 70 cm. Commun : 20 à 35 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Déchets de nourriture de son hôte. Petits poissons et invertébrés.
Habitat : Pélagique, accompagnant souvent les grands pélagiques (thons, etc...) ; se rencontre aussi sous les épaves flottantes.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 III-VI , D2 I - 26-28 ; A II , I 16-18.



Description :

– Corps allongé.
– Coloration gris-bleuté.
– Cinq à sept bandes verticales sombres sur le corps dont trois visibles sur la dorsale et l'anale.
– Carène charnue sur le pédoncule caudal terminant la ligne latérale.
– Première dorsale formée de quatre petits rayons libres.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Seriola dumerili (Risso, 1810).
Synonymes : – Trachurus aliciolus Rafinesque, 1810.
– Caranx dumerili Risso, 1810.

Nom F.A.O : Sériole couronnée.
Noms locaux : Lintchola (BS) ; Limon (BH,Al.An,K) ; Pech-limon (B) ; Lichola (Gh).
Taille maximale : 150 cm. Commun : 50 à 100 cm.
Engins de capture : Traines ; lignes ; filets maillants ; chaluts ; harpons.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps – Eté.
Régime alimentaire : Petits invertébrés (Crustacés-Mollusques) et petits poissons (Clupéidés).
Habitat : Pélagique côtier en eaux tempérées chaudes, jeunes fréquents et abondants dans les lagunes et étangs salés ; fréquent en Algérie, surtout en été.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VI-VIII , D2 I - 26-28 ; A II , I 16-18.



Description :

– Corps massif mais assez élancé.
– Coloration gris bleuté présentant des reflets roses et jaunâtres ; jeunes verdâtres.
– Rayons de la première dorsale réunis par une membrane.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Trachinotus ovatus (Linné, 1758).
Synonymes : – Lichia glaucus Cuvier, 1832.
– Lichia glauca Günther, 1860.

Nom F.A.O : Palomine.
Noms locaux : Paiomina (BS) ; Etoile (Al,B,An) ; Chèvre (BH) ; Paromila (Gh).
Taille maximale : 70 cm. Commun : 15 à 35 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; lignes ; seines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps – Eté.
Régime alimentaire : Petits invertébrés et petits Clupéidés.
Habitat : Pélagique côtier très fréquent et abondant en Algérie, sur la côte et dans les ports.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I,V-VI , D2 I, 24-25 ; A II-I , 23-25.



Description :

– Corps comprimé et aplati latéralement.
– Coloration bleu sombre, ventre argenté.
– Quatre ou cinq taches noires sur la ligne latérale, plus ou moins marquées.
– Extrémités de nageoires dorsale, anale et caudale noirâtres.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868).

Synonymes :

- Suareus furnestini Dardignac et Vincent, 1958.
- Caranx trachurus var, mediterraneus Steindachner, 1868.

Nom F.A.O : Chinchard à queue jaune.

Noms locaux : Tonino (BS) ; Tcherel, Saourine (Al) ; Saorel impérial (An) ; Saorel-elzrag (BH) ; Saourel imperial (K) ; Torino (Gh).

Taille maximale : 50 cm. Commun : 20 à 30 cm.

Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Eté.

Régime alimentaire : Poissons – Crustacés.

Habitat : Semi pélagique, relativement côtier ; fréquente des eaux relativement moins salées que les deux autres espèces du même genre.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 I-VIII , D2 I 28-33 +1 ; A II,I 25-31 +1.



Description :

- Coloration gris-vert, sombre sur le dos ; ventre clair.
- Ligne latérale principale recouverte de scutelles, les premières étant presque transparentes.
- Ligne latérale secondaire se terminant au niveau du troisième rayon de la seconde dorsale.
- Tache noire sur l'opercule.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Trachurus picturatus (T.E. Bowdich, 1825).
Synonymes : – Trachurus rissoi Giglioli, 1880.
– Caranx suareus (Risso in Cuv., Val, 1833).

Nom F.A.O : Chinchard du large.
Noms locaux : Tcherel, Saourine (Al) ; Saorel (An).
Taille maximale : 60 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Crustacés essentiellement.
Habitat : Semi-pélagique surtout au large (au dessus du talus) dans les eaux claires.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-VIII , D2 I- 30-37 ; A II,I - 26-30.



Description :

– Coloration gris-bleu foncé, les nageoires (surtout la caudale) présentant des reflets rougeâtres.
– Tache noire au niveau de l'opercule.
– Ligne latérale secondaire se terminant au niveau du cinquième rayon de la deuxième dorsale.
– Scutelles de la ligne latérale principale plus nombreuses que chez *T.mediterraneus*.
– Dernier rayon de la deuxième dorsale et de l'anale libre.

Famille : CARANGIDAE

Espèce : Trachurus trachurus (Linné, 1758).
Synonymes : – Caranx trachurus Lacépède, 1801.

Nom F.A.O : Chinchard d'Europe.
Noms locaux : Khouril (BS,Or) ; Tcherel, Saourine (Al) ; Saouril, Saourine (B) ; Saourel (An,K) ; Sauril (Gh) ; Saurel, Japonais (BH).
Taille maximale : 35 cm ; Commun : 20 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Poissons-Invertébrés.
Habitat : Semi-pélagique sur le plateau continental et le bord du talus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-VIII , D2 I , 28-33 + 1 ; A II-I , 25-31 + 1.



Description :

- Coloration gris-vert, ventre clair.
- Ligne latérale secondaire se terminant très en arrière de la deuxième dorsale.
- Scutelles de la ligne latérale de plus grandes tailles et en moyenne moins nombreuses que chez *T.picturatus et T.mediterraneus.*
- Tache noire sur l'opercule.

Famille : CENTRACANTHIDAE

Espèce : Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810.
Synonymes : – Smaris insidiator Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Picarel guetteur.
Noms locaux : Cigarette, Caramel (B,O) ; Bogga el hamra (BH) ; Jaret (BS).
Taille maximale : 21 cm. Commun : 8 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes ; filets maillants ;lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Petits poissons et crustacés.
Habitat : Semi-pélagique pouvant constituer des bancs importants, surtout fréquent et abondant dans les régions insulaires (Habibas) ; peut se capturer aussi au large.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XIII , 9-10 ; A III , 9-10.



Description :

- Corps effilé.
- Coloration brun-caramel, nageoires rougeâtres (surtout la caudale).
- Dorsale longue, ondulée, échancrée dans son milieu.
- Yeux très développés.
- Bouche très protractile.
- Tache latérale peut marquée ou absente.

Famille : CENTRACANTHIDAE

Espèce : Spicara maena (Linné, 1758).
Synonymes : – Maena jusculum Valenciennes, 1829.
– Maena maena Canestrini, 1874.

Nom F.A.O : Mendole.
Noms locaux : Tchoukla (BS,Al,BH) ; Kârous, Chpigre (B) ; Schpigue (An) ; Tchucla (Gh).
Taille maximale : 25 cm(mâles) ; 21 cm (femelles). Commun : 12 à 20 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Printemps – Automne.
Régime alimentaire : Invertébrés et végétaux.
Habitat : Semi-pélagique, souvent en bancs ; vit essentiellement au dessus du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII , 11-12 ; A III , 9-10.



Description :

– Corps assez massif ; femelle plus élancée.
– Coloration variable selon l'état de maturité sexuelle, gris plus ou moins bleutée ; taches claires sur les nageoires.
– Dorsale d'un seul tenant.
– Tache sombre environ au milieu du corps sous la ligne latérale.
– Bouche assez protractile.

Famille : CENTRACANTHIDAE

Espèce : Spicara smaris (Linné, 1758).
Synonymes : – Maena smaris Canestrini, 1874.
– Sparus smaris Linné, 1758.

Nom F.A.O : Picarel.
Noms locaux : Tchoukla (BS,Al,BH) ; Kârous, Chpigre (B) ; Schpigue (An) ; Tchucla (Gh).
Taille maximale : 20 cm(mâles) ; 15 cm (femelles). Commun : 8 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Février à mai.
Régime alimentaire : Invertébrés.
Habitat : Semi-pélagique, parfois rassemblé en bancs, au dessus du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D IX , 11-12 ; A III , 9-10.



Description :

- Corps allongé, élancé.
- Coloration grise, parfois rougeâtre, ventre clair ; femelles plus ternes.
- Tête plus longue que la hauteur du corps.
- Tache sombre environ au tiers antérieur du corps sous la ligne latérale.
- Bouche assez protractile.

Famille : CEPOLIDAE

Espèce : Cepola macrophthalma (Linné, 1758).
Synonymes : – Ophidion taenia Linné, 1766.
– Cepola rubescens Linné, 1766.

Nom F.A.O : Cépole commune.
Noms locaux : Sinta (BS) ; Al-basla (Al) ; Sbet (An).
Taille maximale : 70 cm . Commun : 15 à 35 cm.
Engins de capture : Chaluts.
Période de reproduction : Printemps – Automne.
Régime alimentaire : Petits crustacés.
Habitat : Surtout sur fonds vaseux ou sableux du large du plateau continental et de la partie supérieure du talus (50-300 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 3 + 64-66 ; A 56-62.



Description :

– Corps en forme de ruban.
– Coloration rouge à rougeâtre sur le dos, jaunâtre ou rose sur le ventres ; corps en partie translucide ; tache rouge foncée sur le premier quart de la dorsale.
– Caudale en forme de pinceau.

Famille : CHLOROPHTHALMIDAE

Espèce : Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840.
Synonymes : – Peloposia candida Facciola, 1883.

Nom F.A.O : Eperlan du large.
Noms locaux : Argentin (An) ; Yeux-verts.
Taille maximale : 40 cm . Commun : 7 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Juillet – août.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Démersal sur fonds vaseux peut sableux du talus entre 150 et 600 m (optimum de 200 à 500 m) ; en Algérie fréquent à l'est et au centre, rare ou absent dans l'ouest.
Distribution : C-E.
Formule radiaire : D 10-12 ; A 7-10.



Description :

– Coloration gris argenté, avec des taches plus sombres.
– Yeux bien développés à iris vert.
– Museau court, mandibule proéminente, bouche ne dépassant pas la partie antérieure de l'œil.
– Rayons de la pectorale pas prolongés en filament.

Famille : CITHARIDAE

Espèce : Citharus linguatula (Linné, 1758).
Synonymes : – Citharus macrolepidotus (Bloch, 1787).
– Pleuronectes linguatula Linné, 1758.

Nom F.A.O : Feuille.
Noms locaux : Peloua (Al) ; Limande (Gh,BS) ; Ousbit (B) ; Pinioua (BH).
Taille maximale : 30 cm . Commun : 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Régime alimentaire : Petits poissons et crustacés.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux, parfois sableux et plus rarement durs du plateau continental de la côte à la partie supérieure du talus (20 - 300 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 64-72 ; A 44-48.



Description :

– Poisson plat.
– Coloration sable ; deux taches foncées sur le pédoncule caudal.
– Ecailles bien développées et rapprochées.
– Yeux à gauche, grands et séparés par une crête osseuse, le supérieur situé un peut en avant de l'autre.
– Premier rayon de la pelvienne épineux.

Famille : CLUPEIDAE

Espèce : Alosa fallax nilotica Geof. St Hilaire, 1808 = *Alosa fallax* *(Lacepède, 1803) (part).*

Synonymes : – Alosa finta (Cuvier, 1829).
– Alosa ficta Duhamel, 1772.

Nom F.A.O : Alose feinte.

Noms locaux : Alose (Al,BH,An,K) ; Salaga (Gh,BS,Or) ; Lalose BH) ; Saraquel (B).

Taille maximale : 55 cm .

Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Printemps.

Régime alimentaire : Planctonophage ; Petits poissons.

Habitat : Anadrome ; pond en eau douce ou légèrement saumâtre ; fréquente en automne et en hiver les eaux marines, au dessus du plateau continental de la côte à 200 m environ ; vie pélagique.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D 4-5 , 12-16 ; A 3 , 16-22.



Description :

– Coloration gris-vert sur le dos, flancs argentés.
– Une seule dorsale.
– Opercule strié dans sa partie postérieure.
– Tache operculaire suivie d'une dizaine de taches.
– Carène ventrale.

Famille : CLUPEIDAE

Espèce : Sardina pilchardus (Walbaum, 1792).
Synonymes : – Arengus minor Cornide, 1788.

Nom F.A.O : Sardine commune.
Noms locaux : Serdine.
Taille maximale : 25 cm .
Engins de capture : Sennes ; sardinal ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Fin automne-Hiver.
Régime alimentaire : Planctonophage.
Habitat : Comportement pélagique ou semi-pélagique (forme des bancs plus ou moins épars de nuit, qui tendent à se regrouper près du fond de jour) sur tout le plateau continental (de la côte à environ 200 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D4 ; 13-14 , A 2 ; 15-19.



Description :

– Coloration bleu sombre sur le dos avec des reflets verdâtres, argentée sur les fancs.
– Opercule strié.
– Une seule dorsale.
– Parfois présence de taches noires sur le dos.
– Ligne latérale non visible.
– Carène ventrale.

Famille : CLUPEIDAE

Espèce *:* Sardinella aurita Valenciennes, 1847.
Synonymes : – Meletta mediterranea Valenciennes, 1847.

Nom F.A.O *:* Allache.
Noms locaux : Latcha (Gh,BS,Or,BH,Al) ; Bouir,Latcha (B) ; Latcha,Latchoum (An).
Taille maximale *:* 33 cm . Commun : 15 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité *:* Gonochorique.
Période de reproduction : Mi-juin à fin septembre.
Régime alimentaire *:* Planctonophage ; petits poissons.
Habitat *:* Pélagique côtier formant des bancs plus ou moins denses dans les estuaires.
Distribution *:* O-C-E.
Formule radiaire *:* D 4 , 13-17 , A 16-18.



Description :

- Coloration gris bleutée avec une bande dorée principale sur les flancs.
- Opercule non strié, échancré, marqué d'une tache noire.
- Une seule dorsale.
- Carène ventrale.
- Deux grandes écailles sur le pédoncule caudal.

Famille : CLUPEIDAE

Espèce : Sardinella maderensis (Lowe, 1814).
Synonymes : – Sardinella granigera Valenciennes, 1847.
– Clupea mederensis Lowe, 1814.

Nom F.A.O : Grande allache.
Noms locaux : Latcha (Al) ; Sarakin (B) ; Salaga (An).
Taille maximale : 30 cm . Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Planctonophage.
Habitat : Pélagique côtier ; peut être abondant à l'est, rare ailleurs.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D I – 15 ; A 17-18.



Description :

– Coloration sombre, flancs argentés.
– Une seule dorsale bordée de noir.
– Une tache noire sur l'épaule.
– Extrémités des lobes de la caudale noires.
– Opercule non strié.
– Carène ventrale.

Famille : CONGRIDAE

Espèce : Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809).
Synonymes : – Muraena balearica Delaroche, 1809.
– Conger opistophthalmus Ranzani, 1840.

Nom F.A.O : Congre des Baléares.
Noms locaux : Hnech ; Congre (BS,Or,Al,B,An).
Taille maximale : 50 cm .
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds sablo-vaseux du plateau continental ; pas très fréquent.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps serpentiforme fortement muqueux.
– Coloration jaunâtre avec des reflets rosâtres.
– Dorsale et anale continues bordées de noir.
– Dorsale débutant au dessus de l'insertion de la pectorale.

Famille : CONGRIDAE

Espèce : Conger conger (Linné, 1758).
Synonymes : – Conger communis Costa, 1844.
– Conger vulgaris Yarrel, 1831.

Nom F.A.O : Congre d'Europe.
Noms locaux : Hnech ; Selbah el bhar (Al) ; Congro (BS,Or) ; Congre (An, K) ; Congri (Gh) ; Congre, Grengue (B) ; Congre, Selbah (BH).
Taille maximale : 300 cm . Commun : 60 à 150 cm.
Engins de capture : Palangres ; lignes ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Carnivore (poissons, crustacés, céphalopodes).
Habitat : Benthique sur fonds rocheux et sableux.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps serpentiforme, muqueux.
– Coloration gris sombre.
– Tête comprise dans une fois et demi la distance allant de la pointe du museau à l'origine de la dorsale.
– Dorsale et anale continues.
– Ligne latérale soulignée de blanc.
– Dorsale débutant au dessus de l'extrémité postérieure des pectorales.

Famille : CORYPHAENIDAE

Espèce : Coryphaena equiselis Linné, 1758.
Synonymes : – Coryphaena equisefis Linné, 1758.

Nom F.A.O : Coryphène dauphin.
Noms locaux : Rat, Souris (BH) ; Coryphène (Al) ; Poisson-maltais (B) ; Lampougue (An).
Taille maximale : 75 cm ; Commune jusqu'à 50 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; palangres ; traines.
Régime alimentaire : Surtout de poissons, et aussi de crustacés et de calmars.
Habitat : Pélagique saisonnier.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 48-57 ; A 23-29.



Description :

– Corps allongé et comprimé.
– Coloration argentée avec des reflets jaunes.
– Tête à profil arrondi.
– Yeux rejetés sur le bas de la tête.
– Ligne latérale sinueuse, avec moins de 200 écailles.
– Petites dents disposées en large surface trapézoidale sur la langue.

Famille : CORYPHAENIDAE

Espèce : Coryphaena hippurus Linné, 1758.
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Coryphène commune.
Noms locaux : Rat, Souris (BH) ; Coryphène (Al) ; Poisson-maltais (B) ; Lampougue (An).
Taille maximale : 200 cm ; Commune jusqu'à 100 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; palangres ; traines.
Régime alimentaire : Surtout de poissons, aussi de crustacés et et calmars.
Habitat : Pélagique, saisonnier, très fréquent et abondant en eaux tempérées chaudes auprès des îles ; abondant au large en été en Algérie.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 58-66 ; A 25-30.



Description :

- Corps allongé et comprimé.
- Coloration bleu turquoise avec des reflets jaunes, flancs gris-verdâtres ; bord de la caudale blanc.
- Tête à profil arrondie.
- Yeux bas.
- Ligne latérale sinueuse, avec plus de 200 écailles.
- Petites dents disposées sur une petite aire ovale sur la langue.

Famille : CYNOGLOSSIDAE

Espèce : Symphurus nigrescens Rafinesque, 1810.
Synonymes : – Plagusia lactea Bonaparte, 1833.

Nom F.A.O : Plagusie sombre.
Noms locaux : Sole.
Taille maximale : 12 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à octobre.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds à tendance sableuse surtout au centre et à l'est algériens ; fréquente le talus continental jusqu'à plus de 1000 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 84-91 ; A 70-79.



Description :

– Poisson plat.
– Yeux à gauche.
– Dorsale et anale continues ; caudale confondue avec ces deux nageoires.
– Absence de pectorales.
– Pas de ligne latérale sur la face oculée.
– Coloration gris jaunâtre avec des taches noires caractéristiques sur la dorsale et l'anale.

Famille : DACTYLOPTERIDAE

Espèce : Dactylopterus volitans (Linné, 1758).
Synonymes : – Cephalacanthus volitans (Linné, 1758).
– Trigla volitans Linné, 1758.

Nom F.A.O : Grodin volant.
Noms locaux : Khouttaifa,Hirondelle (Al,BH) ; Tifireless, Hirondelle (B) ; Poisson-volant (An) ; Grondin (Gh,Or) ; Ferkh el bhar (K).
Taille maximale : 50 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à juillet.
Régime alimentaire : Crustacés benthiques ; mollusques bivalves et petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds sableux ou vaseux du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 II+IV , D2 I-8 ; A 6 + 28-30.



Description :

– Corps à tête forte et aplatie dorsalement.
– Coloration brunâtre ou roussâtre, avec des taches claires sur les péctorales.
– Fortes épines operculaires.
– Pectorales bleues sur la face interne et très développées.
– Deux premiers rayons de la première dorsale libres.

Famille : ENGRAULIDAE

Espèce : Engraulis encrasicolus (Linné, 1758).
Synonymes : – Engraulis encrasicholus Cuvier, 1817.
– 1s-sp : Engraulis encrasicholus mediterraneus Aleksandrov, 1927.

Nom F.A.O : Anchois commun.
Noms locaux : Menchouba (Al) ; Antchova (BS,Or) ; Antchouba, Lanchoi (B) ; Anchois (An) ; Lanchoi (BH,K) ; Bocorone (Gh).
Taille maximale : 20 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ;
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Planctonophage.
Habitat : Pélagique de surface, vivant près du fond pendant l'hiver jusqu'à 100 à 150 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 15-18 ; A 15-18.



Description :

– Corps élancé.
– Coloration bleu sombre sur le dos, argenté sur les flancs pour les formes du large, dos verdâtre pour les formes côtières.
– Bouche infère.
– Une dorsale.

Famille : EXOCOETIDAE

Espèce : Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1846).
Synonymes : – Exocoetus rondeletii Valenciennes, 1846.

Nom F.A.O : Exocet – ailes noires.
Noms locaux : Khottaifa (Al) ; Soltana (BS) ; Tiflilis (Gh).
Taille maximale : Jusqu'à 25 cm.
Engins de capture : Sennes ; trémails.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Planctonophage.
Habitat : Pélagique superficiel assez commun en été.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : ***D 10-12 ; A 11-13.***



Description :

– Coloration bleu sombre sur le dos et argentée sur les flancs.
– Pectorale haute et très développée.
– Une dorsale plus courte que l'anale.
– Lobe inférieur de la caudale plus développé que le supérieur.

Famille : GADIDAE

Espèce : Gadiculus argenteus argenteus Guichenot, 1850.

Synonymes : – Gadiculus argenteus Guichenot, 1850.

Nom F.A.O : Merlan argenté.

Noms locaux : Néant.

Taille maximale : 15 cm.

Engins de capture : Chaluts de fond.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Décembre – janvier.

Régime alimentaire : Petits crustacés.

Habitat : Démersal ; fréquente le talus continental et son bord (de 100 à 700 m, optimum de 200 à 400 m) ; fonds vaseux et sablo-vaseux.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 9-13 , D2 14-17 , D3 15-18 ; A1 15-19 ; A2 15-19.



Description :

– Corps pratiquement aplati sur la face dorsale.
– Coloration gris assez clair.
– Tête bien développée.
– Yeux bien développés.
– Absence de barbillons mentonniers.
– Trois dorsales séparées.
– Deux anales.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GADIDAE

Espèce : Micromesistius poutassou (Risso, 1826).
Synonymes : – Gadus poutassou (Risso, 1826).
– Merlangus poutassou Risso, 1826.

Nom F.A.O : Merlan bleu.
Noms locaux : Mernouze (Al) ; Baccalao (BS) ; Figuemachk (B) ; Pacalow (Gh) ; Faux merlan, Mernouze (BH) ; Merlan (An).
Taille maximale : 50 cm . Commun : 15 à 30 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : A partir de février.
Régime alimentaire : Petits crustacés.
Habitat : Nectonique à l'état adulte, pélagique à l'état jeune ; fréquente le plateau continental à partir de 50 m, le talus continental et son bord jusqu'à près de 1000 m (optimum de 200 à 400 m) ; remonte vers la surface de nuit.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 11-14 , D2 10-14 , D3 20-26 ; A1 33-39 ; A2 20-27.



Description :

– Corps élancé.
– Coloration gris bleutée, le dessus de la tête bordeaux.
– Pas de barbillons mentonniers ; mandibule peu proéminente.
– Trois dorsales bien séparées.
– Deux anales.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GADIDAE

Espèce : Molva dypterygia macrophthalma (Rafinesque, 1810).

Synonymes : – Phycis macrophthalmus Rafinesque, 1810.
– Gadus elongatus Otto, 1812.
– Molva elongata (Risso, 1821).

Nom F.A.O : Lingue bleue.

Noms locaux : Fausse mustelle.

Taille maximale : 130 cm . Commun : 20 à 80 cm.

Engins de capture : Chaluts de fond ; palangres.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Fin hiver et début printemps.

Régime alimentaire : Crustacés – poissons.

Habitat : Benthique, sur fonds vaseux du talus continental au delà de 400 m ; pas très fréquente.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 10-12 , D2 74-83 ; A 73-78.



Description :

– Corps allongé.
– Coloration grise, une ligne claire sur les flancs.
– Petit barbillon mentonnier.
– Deux dorsales, la première courte, plus haute et bordée de noir.
– Une anale.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GADIDAE

Espèce : Phycis blennoides (Brünnich, 1768).
Synonymes : – Gadus blennoides Brünnich, 1768.
– Blennius gadoides Lacépède, 1800.

Nom F.A.O : Phycis de fond.
Noms locaux : Mostela (Gh) ; Mystelle (BS,Or) ; Moustelle (BH,A,B,An) ; Makala (K).
Taille maximale : 80 cm . Commun : 15 à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à avril.
Régime alimentaire : Crustacés, parfois poissons.
Habitat : Démersal sur fonds vaseux ou sablo-vaseux entre 80 et plus de 1000 m (optimum 400 - 800 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 8-11 , D2 54-64 ; A 50-58.



Description :

– Corps trapu et mou.
– Coloration blanchâtre avec des reflets bordeaux sur la tête et le dos.
– Petit barbillon mentonnier.
– Deux dorsales, la première plus courte avec le troisième rayon plus allongé.
– Pelvienne en filament bifide dépassant l'origine de l'anale.
– Une anale.
– Dorsale, anale et caudale bordées de noir à l'arrière.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GADIDAE

Espèce : Phycis phycis (Linné, 1766).
Synonymes : – Blennius phycis Linné, 1766.
– Tinca marina Walbaum, 1792.

Nom F.A.O : Phycis de roche.
Noms locaux : Mostela (Gh) ; Mystelle (BS,Or) ; Moustelle (BH,A,B,An) ; Makala (K).
Taille maximale : 65 cm . Commun : 10 à 40 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à mai.
Régime alimentaire : Petits poissons et divers invertébrés.
Habitat : Démersal sur fonds durs, sableux, vaseux ou rocheux du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 9-11 , D2 56-65 ; A 52-64.



Description :

– Corps trapu et mou.
– Coloration marron.
– Barbillon mentonnier.
– Deux dorsales, la première plus courte.
– Pelvienne en filament bifide n'atteignant par l'insertion de l'anale.
– Une anale.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GADIDAE

Espèce : Trisopterus minutus capelanus (Lacepède, 1800).
Synonymes : – Gadus capelanus Lacepède, 1800.
– Trisopterus minutus (Linné, 1758).

Nom F.A.O : Capelan.
Noms locaux : Faux-merlan.
Taille maximale : 26 cm . Commun : 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mars-avril et décembre à mai.
Régime alimentaire : Crustacés décapodes et petits poissons.
Habitat : Nectonique sur fonds vaseux, sablo-vaseux ou de sable grossier du plateau continental de 50 à 250 m (optimum autour de 150 m ; fréquent et abondant en Algérie orientale, parait absent à l'ouest, rare ou absent au centre.
Distribution : Est algérien.
Formule radiaire : D1 11-15 , D2 16-26 , D3 17-24 ; A1 26-31 , A2 17-25.



Description :

– Corps élancé.
– Coloration jaunâtre avec des reflets gris sur le dos.
– Barbillon mentonnier.
– Trois dorsales séparées.
– Deux anales.
– Pas de rayons durs aux nageoires.

Famille : GOBIIDAE

Espèce : Gobius niger jozo (Linné, 1758).
Synonymes : – Gobius niger Linné, 1758.
– Gobius jozo Linné, 1758.

Nom F.A.O : Gobie noir.
Noms locaux : Gobie, Chadi (Al) ; Gabolé (BS) ; Gobye (An) ; Cabote (Gh).
Taille maximale : Jusqu'à 25 cm.
Engins de capture : Sennes ; trémails.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mars à mai.
Régime alimentaire : Crustacés, mollusques, polychètes, petits poissons.
Habitat : Benthique, commun sur le plateau continental surtout sur fonds vaseux et sablo-vaseux, de la côte à 100 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 V-VII , D2 I 10-13 ; A I 10-13.



Description :

– Corps assez allongé et muqueux.
– Coloration sombre, avec des bandes plus foncées plus ou moins marquées sur les dorsales.
– Yeux globuleux.
– Rayons de la première dorsale hauts, dépassant la membrane.

Famille : HAEMULIDAE.

Espèce : Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833).
Synonymes : – Pristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833).
– Diagramma octolineatum Valenciennes, 1833.

Nom F.A.O : Grondeur rayé.
Noms locaux : Ronfleur (Al).
Taille maximale : 40 cm ; commun jusqu'à 25 cm.
Engins de capture : Trémails ; chaluts ; lignes.
Régime alimentaire : Crustacés et mollusques.
Habitat : Fonds sableux et rocheux jusqu'à environ 50 m de profondeur ; assez rare.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XIII-14-15 ; A III-7.



Description :

– Corps comprimé.
– Coloration brune.
– Quatre rayures longitudinales.
– Ecailles perforées sur la ligne latérale.
– Narines bien marquées.

Famille : HAEMULIDAE.

Espèce : Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850).
Synonymes : – Diagramma mediterraneum Guichenot, 1850.
– Parapristipoma mediterraneum (Guichenot, 1850).

Nom F.A.O : Diagramme gris.
Noms locaux : Ronfleur, Cra-cra (Al, BH).
Taille maximale : 60 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; filets de fond.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques et zooplancton.
Habitat : Côtier sur fonds sablo-vaseux ; assez fréquent.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII-17-19 ; A III-8-9.



Description :

– Corps comprimé.
– Coloration brune plus foncée sur le dos.
– Ecailles perforées sur la ligne latérale.
– Narines bien marquées.

Famille : HAEMULIDAE.

Espèce : – Pomadasys incisus Lowe, 1814.
Synonymes : – Pomadasys bennetti (Bowdiche, 1825).
– Orthopristis bennetti Jordan et Fesle, 1893.

Nom F.A.O : Grondeur métis.
Noms locaux : Ronfleur (Al) ; Cra-cra (B).
Taille maximale : 50 cm ; commun jusqu'à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; sennes ; filets maillants.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques et poissons.
Habitat : Espèce côtière, de la côte à 60 m environ, fréquente les fonds vaseux ou sablo-vaseux ; assez fréquent.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII-15-17 ; A III-11-13.



Description :

– Corps comprimé.
– Coloration gris-verdâtre avec des reflets jaunes.
– Tache noire sur l'arrière de l'opercule.
– Seconde épine de l'anale plus forte.
– Narines bien marquées.

Famille : LABRIDAE

Espèce : Coris julis (Linné, 1758).
Synonymes : – Labrus julis Linné, 1758.

Nom F.A.O : Girelle.
Noms locaux : Aroussa, Demoiselle (Al) ; Aroussa, Girelle (B) ; Demoiselle (BH).
Taille maximale : 25 cm ; commun 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Avril à août.
Régime alimentaire : Invertébrés.
Habitat : Fonds côtier, près des herbiers et des rochers plus rare au large jusqu'à environ 120 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D IX , 12 ; A III 11-12.



Description :

- Corps élancé , muqueux aux couleurs vives, surtout chez les mâles ; bande longitudinale brun-rosé sur les flancs.
- Tache bleu foncé sur l'arrière de l'opercule.
- Ligne latérale normale incurvée au niveau de l'arrière de la dorsale.
- Dimorphisme sexuel important.

Famille : LABRIDAE

Espèce : Symphodus (Crenilabrus) melops (Linné, 1758).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Crénilabre melops.
Noms locaux : Racaou (Al).
Taille maximale : 28 cm ; commun 10 à 20 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Mars à juin.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Eaux côtières près des rochers et des herbiers jusqu'à 30 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XV-XVII 8-10 ; A III 8-11.



Description :

- Corps oval.
- Coloration variable.
- Tache noire sur le pédoncule caudal au dessous de la ligne latérale.
- Tache sombre à l'arrière de l'œil en forme de croissant.

Famille : LABRIDAE

Espèce : Thalassoma pavo (Linné, 1758).
Synonymes : – Labrus pavo Linné, 1758.

Nom F.A.O : Girelle paon.
Noms locaux : Racaou (Al) ; Demoiselle (BH).
Taille maximale : 25 cm ; commun 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés et petits poissons.
Habitat : Littorale sur fonds sableux, vaseux ou rocheux et herbiers du plateau continental jusqu'à 150 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D IX-X , 11-12 ; A III 11-13.



Description :

– Corps élancé, mais plus trapu que la girelle.
– Coloration variable selon le sexe, à dominance bleu et vert avec des taches rouges et marrons.
– Caudale fourchue chez les adultes, surtout chez les mâles, droite chez les jeunes.
– Dichromisme sexuel.

Famille : LABRIDAE

Espèce : Xyrichthys novacula (Linné, 1758).
Synonymes : – Coryphaena novacula Linné, 1758.
– Xyrichthys cultractus Valenciennes, 1840.

Nom F.A.O : Razon.
Noms locaux : Rasoir, Razoul, Rason (Al) ; Epingle, Mechta (B).
Taille maximale : 30 cm ; commun 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés et petits poissons.
Habitat : Benthique, côtier, sur fonds meubles ; s'enfonce dans le sable ; pas rare.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D IX-X , 11-12 ; A III 11-13.



Description :

– Corps comprimé.
– Profil de la tête pratiquement droit.
– Œil haut.
– Ligne latérale en deux parties décalées au niveau de l'arrière de la dorsale.
– Coloration générale rose avec des marbrures vertes ou grises.
– Dichromisme sexuel.

Famille : LOPHIIDAE

Espèce : Lophius budegassa Spinola, 1807.
Synonymes : – Lophius parvipinnis Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Baudroie rousse.
Noms locaux : Lotte, Crapaud (Al) ; Rapé (BS) ; Chitane delbhar, Baudroie (B) ; Baudroie (An,K) ; Crapa, Boudroie (BH) ; Rapi (Gh).
Taille maximale : 100 cm . Commun : 20 à 60 cm.
Engins de capture : Chaluts ; trémails ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Février à juillet.
Régime alimentaire : Surtout de poissons, occasionnellement d'oiseaux marins.
Habitat : Benthique sur fonds meubles de la côte à plus de 800 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-I-I-III ; D2 8-9 ; A 8-9.



Description :

- Corps pratiquement aplati dorso-ventralement.
- Grosse tête large et aplatie ; yeux jaune vert.
- Dentition importante en crochets.
- Nombreux lambeaux cutanées sous la tête et sous le tronc.
- Une dorsale située à l'arrière du corps.
- Filaments pêcheurs sur la tête.
- Mésentère noir.
- Coloration brune assez claire dorsalement, blanchâtre ventralement.

Famille : LOPHIIDAE

Espèce : Lophius piscatorius Linné, 1758.
Synonymes : – Lophius piscator Mitchill, 1815.
– .Batrachus piscatorius Risso, 1810.

Nom F.A.O : Baudroie commune.
Noms locaux : Lotte, Crapaud (Al) ; Rapé (BS) ; Chitane delbhar, Baudroie (B) ; Baudroie (An,K) ; Crapa, Boudroie (BH) ; Rapi (Gh).
Taille maximale : 200 cm . Commun : 20 à 100 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps - été.
Régime alimentaire : Surtout de poissons.
Habitat : Benthique sur fonds meubles plus ou moins grossiers du plateau et du talus continental jusqu'à plus de 800 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 I-I-I-III ; D2 11-12 ; A 9-11.



Description :

– Coloration brune violacée plus ou moins marbrée dorsalement blanchâtre ventralement.
– Mésentère blanc.
– Autres caractères identiques à ceux de *L. budegassa.*

Famille : MACRORAMPHOSIDAE

Espèce : Macroramphosus scolopax (Linné, 1758).
Synonymes : – Balistes scolopax Linné, 1758.
– Macroramphosus gracilis (Lowe, 1839).

Nom F.A.O : Bécasse de mer.
Noms locaux : Trompette de mer, Laraq (Al) ; Pech trempette (B) ; Poisson-trompette (An).
Taille maximale : 20 cm ; commun de 8 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Hiver.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques et pélagiques.
Habitat : Nectonique, semi-pélagique, pélagique à l'état jeune ; grégaire.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 V-VI , D2 I 10-13 ; A 18-30.



Description :

– Corps oval de couleur rose.
– Coloration rose orange à l'état adulte ; l'espèce décrite sous le nom de *M. gracilis* correspond à des jeunes en phase pélagique et leur coloration est verdâtre.
– Museau tubiforme, trés allongé.
– Deux dorsales, le deuxième rayon de la première dorsale fort, long et barbelé sur sa partie postérieure.

Famille : MACROURIDAE

Espèce : Coelorynchus coelorynchus (Risso, 1810).
Synonymes : – Coelorinchus coelorinchus (Risso, 1810).

Nom F.A.O : Grenadier.
Noms locaux : Far, Toba (Al).
Taille maximale : 38 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthopélagique sur fonds meubles à partir de 100 m environ jusqu'au talus et son bord aux environs de 1000 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 10-11.



Description :

- Corps allongé, fortement rugueux se terminant par une caudale en fouet ; museau plus court que l'œil, abdomen écailleux.
- Coloration grise avec des flancs sombres, ventre plus clair.
- Première dorsale courte et haute avec le premier rayon lisse, la deuxième continue avec l'anale.
- Bouche infère avec un barbillon mentonnier.
- Museau triangulaire.
- Œil bien développé.
- Premier rayon de la pelvienne développé.

Famille : MACROURIDAE

Espèce : Nezumia sclerorhynchus (Valenciennes, 1838).
Synonymes : – Macrurus violaceus Zugmayer, 1911.
– Nezumia aequalis Günther, 1878.(?)

Nom F.A.O : Grenadier.
Noms locaux : Far, Toba (Al).
Taille maximale : 30 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthodémersal sur fonds vaseux du talus continental, surtout après 300 m et jusqu'à 1000 m et plus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 11-12.



Description :

– Corps allongé, fortement rugueux se terminant par une caudale en fouet.
– Coloration brune avec des flancs plus sombres.
– Première dorsale courte et haute avec le premier rayon dentelé, la deuxième continue avec l'anale.
– Bouche infère avec un barbillon mentonnier.
– Museau avec une extrémité tuberculeuse avec le dessous sans écailles.
– Premier rayon de la pelvienne bien développé.

Famille : MACROURIDAE

Espèce : Trachyrhynchus trachyrhynchus (Risso, 1810).
Synonymes : Trachyrincus scabrus (Rafinesque, 1810).

Nom F.A.O : Grenadier.
Noms locaux : Far.
Taille maximale : 50 cm .
Engins de capture : Chaluts de fond.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Fonds du talus à tendance sableuse ; peut être extrêmement abondant notamment dans l'ouest algérien à une profondeur de 300 à 1000 m.
Distribution : O.



Description :

- Corps allongé se terminant par une caudale en fouet.
- Coloration gris clair, ventre blanchâtre.
- Tête se terminant par un long rostre pointu, barbillon mentonnier très petit.
- Forte carène de part et d'autre de la dorsale et de l'anale.

Famille : MERLUCCIIDAE

Espèce : Merluccius merluccius (Linné, 1758).
– 1s-sp : Merluccius merluccius mediterraneus Cadenat, 1950.

Synonymes : – Gadus merluccius Linné, 1758 (part).

Nom F.A.O : Merlu commun.

Noms locaux : Mernouze (Al) ; Lirjous, Merlan (BS) ; Mernouze, Merlan (B) ; Merlan (Gh,Or,BH,An,K).

Taille maximale : 110 cm . Commun : 15 à 60 cm.

Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; palangres.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Toute l'année surtout hiver et printemps

Régime alimentaire : Carnassier, principalement poissons, parfois crustacés

Habitat : Fonds divers du plateau à partir d'environ 25 - 30 m (jeunes) et du talus jusqu'à près de 800 m (femelles) ; nectonique, peut s'approcher de la surface la nuit en chassant, près du fond ou sur le fond pendant le jour.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 9-11 , D2 36-40 ; A 36-40.



Description :

– Corps élancé et mou.
– Coloration grisâtre avec des reflets argentés.
– Deux dorsales, la première courte, la deuxième pratiquement symétrique et identique à l'anale.
– Pas de rayons durs aux nageoires.
– Pas de barbillon mentonnier.

Famille : MOLIDAE

Espèce **:** Mola mola (Linné, 1758).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O **:** Poisson lune.
Noms locaux : Poisson lune (Al,BS,An) ; Poisson soleil (B) ; Mola (Gh).
Taille maximale **:** 3 m ; commun 50 à 100 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; chaluts ; palangres.
Régime alimentaire **:** Méduses, coelentérés, algues, ophiures et larves d'anguilles.
Habitat **:** Epipélagique jusqu'à 360 m.
Distribution **:** O-C-E.
Formule radiaire **:** D 16-20 ; A 14-18.



Description :

- Corps oval presque circulaire, peau rugueuse et tuberculée.
- Coloration gris brun, sombre sur le dos, plus claire sur les flancs, ventre argenté.
- Une dorsale et une anale opposées et hautes.
- Caudale très réduite.
- Petite bouche surmontée d'un museau légèrement proéminent.

Famille : MORONIDAE

Espèce : Dicentrarchus labrax (Linné, 1758).
Synonymes : – Morone labrax (Linné, 1758).
– Labrax lupus Cuvier, 1828.

Nom F.A.O : Bar européen.
Noms locaux : Loup (Al) ; Gonfar (BS) ; Loup, Kaross (B) ; Karous (An) ; Liobarro (Gh) ; Loup (BH, K).
Taille maximale : 100 cm . Commun : 30 à 60 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; traines ; palangres ; lignes; harpons.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à mars.
Régime alimentaire : Prédateur vorace, petits poissons en bancs et invertébrés.
Habitat : Eaux côtières peu profondes ; comportement semi-pélagique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-IX , D2 I- 12-13 ; A III , 10-12.



Description :

– Corps élancé.
– Coloration gris argenté, ponctuation sombre diffuse chez les jeunes seulement, avec des flancs-blanchâtres.
– Deux dorsales bien distinctes, la première à rayons durs, la deuxième présentant le premier rayon dur et court.
– Caudale légèrement échancrée.
– Tache noire sur le bord supérieur de l'opercule.

Famille : MORONIDAE

Espèce : Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792).
Synonymes : – Morone punctatus (Bloch, 1792).
– Labrax orientalis Günther, 1863.

Nom F.A.O : Bar tacheté.
Noms locaux : Loup (Al) ; Gonfran (BS) ; Loup (B, K) ; Karous (An) ; Liobarro (Gh) ; Loup moucheté (BH).
Taille maximale : 70 cm . Commun : 20 à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; traines ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à avril.
Régime alimentaire : Prédateur vorace, poissons, crustacés, mollusques.
Habitat : Eaux côtières et saumâtres sur fonds sableux , sablo-vaseux ou rocheux ; comportement semi-pélagique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-IX , D2 I- 11-13 ; A III , 10-12.



Description :

– Corps élancé, ramassé sur l'arrière.
– Coloration gris-argenté avec des petites taches noires nettes et nombreuses sur le dos et sur les flancs chez les jeunes et les adultes.
– Deux dorsales bien nettes, la première à rayons durs, la deuxième présentant le premier rayon dur et court.
– Caudale légèrement échancrée.
– Opercule présentant une tache noire.

Famille : MUGILIDAE

Espèce **:** Chelon labrosus (Risso, 1826).
Synonymes : – Mugil chelon Cuvier, 1829.
– Mugil provensalis nec Risso, L.Rey, 1935.

Nom F.A.O **:** Mulet lippu.
Noms locaux : Bourri (BS,Or,Al,B,An,K) ; Lilza (Gh) ; Mulet, Loup (BH).
Taille maximale **:** 60 cm .
Engins de capture : Lignes ; éperviers ; sennes ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité **:** Gonochorique.
Période de reproduction : Fin hiver-printemps.
Régime alimentaire **:** Omnivore.
Habitat **:** Pélagique en eaux côtières.
Distribution **:** O-C-E.
Formule radiaire **:** D1 IV , D2 I-7-10 ; A III-8-9.



Description :

- Corps fuselé et massif.
- Coloration sombre sur le dos, argentée sur les flancs.
- Tête aplatie.
- Membrane nictitante sur l'œil.
- Deux dorsales, la première à rayons durs la seconde à rayons mous avec le premier rayon dur et court.
- Caudale légèrement échancrée.

Famille : MUGILIDAE

Espèce : Liza aurata (Risso, 1810).
Synonymes : – Mugil auratus Risso, 1810.

Nom F.A.O : Mulet doré.
Noms locaux : Bourri-mdahab (Al) ; Bourri (BS,Or,An) ; Bouri, Boussefra (B) ; Lilza (Gh) ; Bourri doré (K) ; Bourri, Mulet (BH).
Taille maximale : 50 cm .
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; éperviers; harpons.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Automne.
Régime alimentaire : Omnivore (végétaux, invertébrés, détritus).
Habitat : Pélagique en eaux côtières.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IV , D2 I-7-9 ; A III-8-9.



Description :

- Corps fuselé et massif.
- Lèvre supérieure mince.
- Coloration gris plombé avec des rayures longitudinales.
- Tache dorée bien délimitée sur l'opercule.
- Deux dorsales, la première épineuse, la seconde molle.

Famille : MUGILIDAE

Espèce : Liza saliens (Risso, 1810).
Synonymes : – Mugil saliens Risso, 1810.

Nom F.A.O : Mulet sauteur.
Noms locaux : Bourri (BS,Or,Al,B,An,K) ; Lilza (Gh) ; Bourri Mulet (BH).
Taille maximale : 40 cm .
Engins de capture : Eperviers ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Omnivore.
Habitat : Pélagique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IV , D2 I-8 ; A III-9.



Description :

– Corps fuselé et élancé.
– Coloration sombre avec des reflets argentés.
– Deux dorsales, la première épineuse, la seconde molle.
– Plusieurs petites taches dorées sur l'opercule.
– Lèvre supérieure fine.

Famille : MULLIDAE

Espèce : Mullus barbatus (Linné, 1758).
Synonymes : – Mullus barbatus barbatus Linné, 1758.
– Mullus ruber Lacépède, 1801.

Nom F.A.O : Rouget barbet de vase.
Noms locaux : Rouget (B,An,K,BH,Or) ; Mlal elkhaz, Rougi (Al) ;
Salmonété (BS).
Taille maximale : 30 cm ; Commun de 12 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; trémails.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à août.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Démersal sur fonds de vase, de sable ou gravier, et même rocheux du plateau continental et du bord du talus de 10 à 300 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VII-VIII , D2 I-7-8 ; A II-6-7.



Description :

– Corps élancé, ramassé vers l'avant.
– Coloration générale rose orangée uniforme, avec des flancs blanchâtres.
– Tête à profil presque droit.
– Deux barbillons mentonniers bien développés.
– Première dorsale à membrane immaculée.

Famille : MULLIDAE

Espèce **:** Mullus surmuletus Linné, 1758.
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O **:** Rouget barbet de roche.
Noms locaux : Mlal el Hadjra (Al) ; Rocca (BS) ; Rougi, Rouget (B,Or,An,BH,Al,K,GH).
Taille maximale **:** 40 cm ; Commun de 10 à 25 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes; harpons.
Sexualité **:** Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à juillet.
Régime alimentaire **:** Invertébrés benthiques (crustacés, crevettes, amphipodes, polychètes...).
Habitat **:** Démersal sur fonds rocheux ou gravelleux de la côte jusqu'au bord du talus (300 m).
Distribution **:** O-C-E.
Formule radiaire **:** D1 VII-VIII , D2 I-7-8 ; A II-6-7.



Description :

- Corps élancé, ramassé vers l'avant.
- Coloration rouge orangée, avec une bande longitudinale plus foncée de l'œil à la caudale ; reflets et bande longitudinales dorées ; flancs blanchâtres.
- Tête à profil assez effilé.
- Deux barbillons mentonniers bien développés.
- Première dorsale avec des bandes jaunes ou brunes.

Famille : MURAENIDAE

Espèce : Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809).
Synonymes : – Lycodontis unicolor (Delaroche, 1809).

Nom F.A.O : Murène brune.
Noms locaux : Mrina.
Taille maximale : 80 cm
Engins de capture : Lignes ; palangres ; filets maillants ; harpons.
Période de reproduction : Saison chaude.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Benthique sur fonds rocheux en eaux peu profondes.
Distribution : O-C-E.

Description :

– Corps serpentiforme recouvert de mucus.
– Tête massive avec un museau raccourci.
– Coloration sombre ou brune.
– Narine antérieure tubulaire.
– Pas de pectorale.
– Dorsale et anale continues.
– Forte dentition en crocs acérés.

Famille : MURAENIDAE

Espèce : Muraena helena Linné, 1758.
Synonymes : – Muraena romana Shaw, 1805.
– Muraena punctata Rafinesque, 1810.

Nom F.A.O : Murène de la Méditérranée.
Noms locaux : Murène, Mrina (Or,Al) ; Murrena (BS,An) ; M'rina (B).
Taille maximale : 130 cm . Commun : 60 à 100 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; filets maillants ; harpons.
Période de reproduction : Saison chaude.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Benthique sur fonds rocheux en eaux peu profondes.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps serpentiforme assez massif recouvert de mucus.
– Tête massive avec un museau assez effilé.
– Coloration brune maculée de taches jaunâtres donnant un aspect "léopard".
– Narines tubulaires.
– Pas de pectorales.
– Dorsale et anale continues.
– Forte dentition en crocs acérés.

Famille : OPHICHTHIDAE

Espèce : Dalophis imberbis (Delaroche, 1809).

Synonymes : – Dalophis bimaculata Rafinesque, 1810.
– Sphagebranchus imberbis Delaroche, 1809.

Nom F.A.O : Serpenton.
Noms locaux : Serpent de mer, H'nach.
Taille maximale : 65 cm.
Engins de capture : Chaluts.
Période de reproduction : Août-septembre.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique. Littoral de 20 à 80 m.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps serpentiforme effilé.
– Museau court et arrondit, recouvert de villosités.
– Coloration grise ; flancs blanchâtres avec des reflets argentés.
– Pectorales rudimentaires.
– Dorsale et anale continues.

Famille : OPHICHTHIDAE

Espèce : Echelus myrus (Linné, 1758).
Synonymes : – Muraena myrus Linné, 1758.

Nom F.A.O : Serpenton miro.
Noms locaux : Serpent de mer, H'nech.
Taille maximale : 100 cm ; commune de 20 à 50 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants.
Période de reproduction : Août-septembre.
Régime alimentaire : Poissons et invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux et sablo-vaseux de la côte au bord du talus ; pas rare dans le centre et l'est algérien.
Distribution : O-C-E.

Description :

- Corps serpentiforme.
- Œil bien développé.
- Coloration gris jaunâtre, lignes blanchâtres caractéristiques sur la tête.
- Pectorale peu développée.
- Dorsale et anale continues bordées de noir ; début de la dorsale à l'aplomb de la partie postérieure de la pectorale.

Famille : OPHICHTHIDAE

Espèce : Ophisurus serpens (Linné, 1758).
Synonymes : – Echelus oxyrhinchus Rafinesque, 1810.

Nom F.A.O : Serpenton à nez long.
Noms locaux : Serpent de mer, H'nech.
Taille maximale : 245 cm ; commune de 50 à 100 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Période de reproduction : Juin à septembre.
Régime alimentaire : Poissons et invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux du plateau continental et de la partie supérieure du talus jusqu'à 400 m environ.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps serpentiforme.
– Museau long et pointu.
– Coloration brun rougeâtre avec le museau plus clair (jaunâtre).
– Pectorale développée.
– Pores latéraux noirâtres.

Famille : OPHIDIIDAE

Espèce : Ophidion barbatum (Linné, 1758).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Donzelle.
Noms locaux : Néant.
Taille maximale : 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants de fond.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques et poissons.
Habitat : Benthique sur fonds sableux et sablo-vaseux du plateau et de la partie supérieure du talus jusqu'à 400 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 124-140 ; A 115-120.



Description :

- Corps allongé, légèrement comprimé.
- Epine rostrale longue sensible au toucher sous la peau sur la partie avant du museau.
- Coloration brunâtre, avec des flancs blanchâtres.
- Pelviennes filamenteuses insérées très en avant rappelant un barbillon mentonnier.
- Dorsale et anale continues bordées de noir.

Famille : PERISTEDIIDAE

Espèce : Peristedion cataphractum (Linné, 1758).
Synonymes : – Trigla cataphracta Linné, 1758.
– Peristedion malarmat Lacepède, 1801.

Nom F.A.O : Malarmat.
Noms locaux : Serdouk el hmar (Al) ; Grondin gaméo (BS) ; Colonel (B) ; Malarma (BH) ; Malarmow (Gh).
Taille maximale : 40 cm . Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Petits invertèbrés benthiques, surtout mollusques gastéropodes et crustacés.
Habitat : Benthique sur fonds variés, sableux à rocheux assez fréquent sur sable grossier et gravier du plateau continental à partir de 50 m environ et du talus jusqu'à 600 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VII-VIII , D2 18-19 ; A 17-21.



Description :

– Corps élancé, recouvert d'écailles donnant un aspect de cuirasse et armé de fortes épines.
– Coloration rouge orangée uniforme.
– Museau se terminant en rostre fourchu.
– Deux barbillons sous mentonniers ramifiés et bien développés.
– Pectorale avec seulement les deux rayons inférieurs libres.

Famille : POMATOMIDAE

Espèce : Pomatomus saltatrix (Linné, 1766).
Synonymes : – Pomatomus saltator (Linné, 1766).
– Temnodon saltator Valenciennes, 1833.

Nom F.A.O : Tassergal..
Noms locaux : Poisson-serre, Asserra (Al) ; Serra (B, An, K) ;
Taille maximale : 110 cm ; commune de 20 à 60 cm.
Engins de capture : Sennes ; filets maillants ; lignes ; chaluts.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Pélagique jusqu'à 200 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VII-VIII , D2 I-25-29 ; A. II-I-25-30.



Description :

– Corps élancé.
– Coloration verdâtre, ventre blanc.
– Deux dorsales, la première basse et entièrement épineuse.
– Anale précédée de deux courtes épines indépendantes.
– Dentition bien acérée.

Famille : SCIAENIDAE

Espèce : Argyrosomus regius (Asso, 1801).
Synonymes : – Sciaena aquila (Lacepède, 1803).
– Argyrosomus regium (Asso, 1801).

Nom F.A.O : Maigre commun.
Noms locaux : Ombrine, Escorbai (Al) ; Loumbernous, Quârous (B) ; Figue (An).
Taille maximale : Max. 200 cm.
Engins de capture : Sennes ; filets maillants ; chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mars à juin.
Régime alimentaire : Carnassier ; poissons (Clupéidés et Mugilidés), et aussi de crustacés pélagiques.
Habitat : Comportement grégaire, semi-pélagique ; ce trouve généralement dans les zones proches des côtes jusqu'à 50 m de profondeur environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IX-X , D2 I- 26-29 ; A II- 6-8.



Description :

– Corps élancé et massif.
– Coloration brun mordoré sur le dos, les flancs et le ventre blancs, nageoires brunes.
– Intérieur de la bouche jaune orangé.
– Deuxième rayon dur de l'anale grêle.
– Pas de barbillon mentonnier.

Famille : SCIAENIDAE

Espèce : Sciaena umbra Linné, 1758.
Synonymes : – Corvina nigra (Bloch, 1791).

Nom F.A.O : Corb commun.
Noms locaux : Corb,Al Ghrâb, Scorbai (Al) ; Haddad (B) ; Corb (An, K) ; Ombrine (BH) ; Corbino (Gh).
Taille maximale : Max. 70 cm ; commun de 20 à 35 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; palangres ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mars à août.
Régime alimentaire : Petit poissons, crustacés, mollusques, polychètes et algues.
Habitat : Fréquente les fonds rocheux et sableux côtiers ; s'éloigne un peu de la côte en hiver.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 X , D2 I- 23-25 ; A II 6-8.



Description :

– Corps trapu.
– Coloration brun noirâtre à reflets dorés.
– Nageoires sombres, avec les rayons durs de l'anale et des pelviennes blancs.
– Deuxième rayon dur de l'anale très épaissi.
– Pas de barbillon mentonnier.

Famille : SCIAENIDAE

Espèce : Umbrina canariensis Valenciennes, 1834.
Synonymes : – Umbrina steindachneri Cadenat, 1950.
– Umbrina lafonti Moreau, 1874.

Nom F.A.O : Ombrine bronze.
Noms locaux : Ombrine (Al,B,BS,An).
Taille maximale : 60 cm ; commune jusqu'à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Fin du printemps au début de l'automne.
Régime alimentaire : Petites crevettes, vers et autres benthiques.
Habitat : Fonds vaseux et sablo-vaseux du plateau continental jusqu'à environ 200 m, rarement plus ; peut être très abondant.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IX-X , D2 I-26-31 ; A II-7.



Description :

– Corps trapu.
– Coloration gris brun avec des reflets mordorés.
– Bord postérieur de l'opercule jaune.
– Dorsale avec 26 à 31 rayons mous.
– Barbillon mentonnier.

Famille : SCIAENIDAE

Espèce : Umbrina cirrosa (Linné, 1758).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Ombrine côtière.
Noms locaux : Ombrine de sable, Chfech (Al) ; Ombrine, Naquâb (B) ; Ombrine (An, BH, K) ; Bagla (Gh).
Taille maximale : 70 cm , commune 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps - été.
Régime alimentaire : Poissons et invertébrés benthiques, et aussi d'algues.
Habitat : Fonds sableux ou sablo-vaseux côtiers.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 X , D2 I-21-25 ; A II-7-8.



Description :

- Corps trapu.
- Coloration gris métallique avec des lignes obliques sinueuses blanchâtres sur le dos orientées d'avant en arrière.
- Dorsale avec 21 à 25 rayons mous.
- Barbillon mentonnier.

Famille : SCIAENIDAE

Espèce : Umbrina ronchus Valenciennes, 1843.
Synonymes : – Umbrina fusca Dardignac, 1961.

Nom F.A.O : Ombrine fusca.
Noms locaux : Ombrine (BS,Al,B,An).
Taille maximale : 75 cm ; commune jusqu'à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; lignes ; filets maillants,.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Juin à août.
Régime alimentaire : Petites crevettes, vers et autres invertébrés benthiques.
Habitat : Fréquente des fonds variés du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 X , D1 I-25-27 ; A II-7.



Description :

– Corps trapu.
– Coloration sombre avec des zébrures sur le dos s'arrêtant au niveau de la ligne latérale.
– Premier rayon dur de l'anale de taille environ la moitié du second.
– Barbillon mentonnier.

Famille : SCOMBERESOCIDAE

Espèce : Scomberesox saurus (Walbaum, 1792).
Synonymes : – Scombresox rondeletii Valenciennes, 1846.

Nom F.A.O : Balaou.
Noms locaux : Aiguille (Al).
Taille maximale : 50 cm ; commun de 25 à 40 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Période de reproduction : Septembre à décembre.
Régime alimentaire : Zooplanctonique.
Habitat : Pélagique, fréquente les eaux claires.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 10-12 + 5-6 ; A 12-14 + 6-7.



Description :

– Corps allongé.
– Coloration bleu foncé, verdâtre sur le dos, flancs et ventre argentés, nageoires verdâtres.
– Bouche se terminant par un rostre en aiguille, la partie inférieure plus allongée.
– Dorsale rejetée en arrière suivie de cinq à six pinnules.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Auxis rochei (Risso, 1810).
Synonymes : – Auxis thazard (nec Lacepède, 1801).
– Auxis bisus (Rafinesque, 1810).

Nom F.A.O : Bonitou-Auxide.
Noms locaux : Melva (Al,BH) ; Cavalla, Stoum (B) ; Stroum (An) ;
Bonitou (Gh, Bs).
Taille maximale : 50 cm (LF) Commun : 30 à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes ; filets maillants ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à septembre.
Régime alimentaire : Petits poissons (spécialement Clupéidés) et macroplancton.
Habitat : Pélagique, fréquente les eaux chaudes superficielles du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 X-XI, D2 11-12 + 7-9 ; A 12-15 + 7-8.



Description :

– Corps fusiforme et massif.
– Coloration bleu vert foncé sur le dos, grisâtre sur les flancs, ventre blanc.
– Bandes dorsales sombres, commençant en arrière de la première dorsale.
– Deux dorsales bien séparées, la seconde suivie de huit pinnules.
– Anale suivie de sept pinnules.
– Pelviennes et pectorales rougeâtres.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Euthynnus alleteratus (Rafinesque, 1810).

Synonymes :

- Euthynnus quadripunctatus (E. Geoffroy St-Hilaire, 1817).
- Scomber quadripunctatus E. Geoffroy St-Hilaire, 1817.

Nom F.A.O : Thonine.

Noms locaux : Bacorète (Al) ; Albaguore (B) ; Thonine (An).

Taille maximale : 100 cm . Commun : 70 à 85 cm.

Engins de capture : Sennes ; filets maillants ; traines.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Printemps à l'été.

Régime alimentaire : Petits poissons pélagiques, larves de poissons, calmars et Crustacés.

Habitat : Pélagique côtier, près des hauts-fonds et au large des iles.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 XIII-XVI, D2 I-II, 11-12+8-9 ; A II-III, 10-12+6-8.



Description :

- Corps fusiforme et massif.
- Coloration bleu foncé sur le dos, ventre argenté.
- Des rayures sombres ne dépassant pas en arrière le tiers de la première dorsale.
- Taches noires sur les flancs entre les pectorales et les pelviennes.
- Deux dorsales, la seconde suivie de huit pinnules.
- Anale suivie de sept pinnules.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Katsuwonus pelamis (Linné, 1758).
Synonymes : – Euthynnus pelamis (Linné, 1758).

Nom F.A.O : Listao. Bonite à ventre rayé.
Noms locaux : Bonite plate (B) ; Bonite mère (An) ; Bonite (Al).
Taille maximale : 100 cm (LF). Commun : 60 à 80 cm.
Engins de capture : Sennes ; bonitières ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps à automne.
Régime alimentaire : Poissons, Céphalopodes et Crustacés.
Habitat : Pélagique, fréquente les eaux claires du large ; saisonnier en Algérie ; plus fréquent dans l'ouest.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 XV-XVI, D2 II-11-16 + 7-8 ; A II, 11-16 + 6-8.



Description :

– Corps fusiforme et massif.
– Coloration gris sombre sur le dos, flancs argentés avec cinq bandes longitudinales sombres.
– Deuxième dorsale suivie de sept à neuf pinnules.
– Anale suivie de sept à huit pinnules.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce *:* Orcynopsis unicolor (E. Geoffroy St Hilaire, 1817).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O *:* Palomètte.
Noms locaux : Palomète (Al).
Taille maximale *:* 130 cm (LF)- Commun : 90 cm.
Engins de capture : Traines ; sennes ; filets maillants ; madrague.
Sexualité *:* Gonochorique.
Période de reproduction : Juillet à septembre.
Régime alimentaire *:* Petits Poissons, spécialement sardines et anchois.
Habitat *:* Pélagique à semi-pélagique fréquentant de préférence les eaux côtières.
Distribution *:* O-C-E.
Formule radiaire *:* D1 X-XIV, D2 12-15+7-9 ; A I-II, 12-14+6-8.



Description :

- Corps trapu et massif, relativement haut.
- Dos bleu noirâtre à verdâtre ; marbrures sur le dos et les flancs ; flancs et ventre clairs légèrement marbrés.
- Deux dorsales, la seconde plus longue et moins haute que la première suivie de sept à neuf pinnules.
- Anale suivie de six à huit pinnules.
- Ligne latérale légèrement sinueuse.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Sarda sarda (Bloch, 1793).
Synonymes : – Thynnus sardus Risso, 1826.
– Scomber palamitus Rafinesque, 1810.

Nom F.A.O : Bonite à dos rayé.
Noms locaux : Al rsela (Al) ; Bonito (BS) ;
Bonite (Or,B,BH,Gh,K) ; Sainte Marie (An).
Taille maximale : 90 cm (LF). Commun : 30 à 50 cm.
Engins de capture : Bonitière ; sennes ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à juillet.
Régime alimentaire : Carnassier vorace, essentiellement de poisson, en particulier petits Clupéidés et Gadidés.
Habitat : Pélagique à semi-pélagique, fréquente les eaux relativement côtières turbides.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 XX-XXIV, D2 12-18+7-10 ; A II, 11-15+6-8.



Description :

– Corps élancé et massif.
– Dos verdâtre balayé par une dizaine de bandes sombres longitudinales et légèrement obliques ; flancs gris argentés ; écailles très petites sauf sur le corselet.
– Deux dorsales, la seconde plus courte et suivie de sept à neuf pinnules.
– Anale suivie de six à huit pinnules.
– Ligne latérale ondulée.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Scomber japonicus Houttuyn, 1780.
Synonymes : – Scomber colias Gmelin, 1788.
– Pneumatophorus colias (Gmelin, 1789).

Nom F.A.O : Maquereau espagnol.
Noms locaux : Kaballa (Al) ; Bacoréta (BS), Maquereau (B,BH) ; Kaval (An, K) ; Cavaya (Gh).
Taille maximale : 50 cm (LF). Commun : 20 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Juin à août.
Régime alimentaire : Petits poissons pélagiques et aussi invertébrés pélagiques.
Habitat : Pélagique à semi-pélagique au dessus des fonds du plateau continental, surtout dans les eaux chaudes en été.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VII-X, D2 12-13+ 5-6 ; A I, 11-12+ 5-6.



Description :

– Corps élancé ; partie supérieure du crâne transparente.
– Dos bleu verdâtre balayé par des bandes sombres sinueuses ; flancs et ventre jaune argenté lavés de gris.
– Œil avec paupière adipeuse.
– Deux dorsales, la seconde suivie de cinq à six pinnules.
– Anale suivie de cinq à six pinnules.
– Pédoncule caudal muni de deux petites carènes.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Scomber scombrus Linné, 1758.
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Maquereau commun.
Noms locaux : Kaballa (Al) ; Cabaya (BS), Maquereau (B,BH) ; Kaval (An, K) ; Cavaya (Gh).
Taille maximale : 50 cm (LF) - Commun : 20 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Hiver et début du printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés pélagiques, surtout de crustacés et aussi de jeunes poissons.
Habitat : Pélagique à semi-pélagique fréquentant de préférence les eaux claires ; présent surtout en hiver.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 X-XIII, D2 9-15+4-6 ; A I-II, 8-9+4-6.



Description :

- Corps élancé.
- Dos bleu verdâtre (relativement plus bleu que *S. japonicus)* avec des bandes sombres presque verticales ; flancs bleu - vert pâle à reflets argentés ; ventre argenté.
- Œil avec paupière adipeuse.
- Deux dorsales, la seconde suivie de quatre à six pinnules.
- Anale suivie de quatre à six pinnules.
- Deux petites carènes sur le pédoncule caudal.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788).
Synonymes : – Germo alalunga (Bonnaterre, 1788).
– Thunnus germo (Lacepède, 1800).

Nom F.A.O : Germon.
Noms locaux : Thon.
Taille maximale : 100 cm (LF) . Commun : 50 à 80 cm.
Engins de capture : Filets maillants ; sennes ; palangres ; traines.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Juillet à septembre.
Régime alimentaire : Anchois, calmars et crustacés, essentiellement.
Habitat : Epi et mésopélagique océanique.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 XII-XIV, D2 III-11-13 +7-9 ; A III-10-12+ 7-9.



Description :

– Corps fusiforme relativement élevé.
– Dos bleu sombre ; ventre blanc argenté.
– Deux dorsales rapprochées, la seconde suivie de sept à neuf pinnules.
– Anale suivie de sept à neuf pinnules.
– Pectorale très longue.
– Arrière de la caudale bordé de blanc.

Famille : SCOMBRIDAE

Espèce : Thunnus thynnus thynnus (Linné, 1758).
Synonymes : – Thunnus thynnus (Linné, 1758).
– Scomber thynnus Linné 1758.

Nom F.A.O : Thon rouge.
Noms locaux : Than (Al), Thon (B,An,Gh,Bh,K) ; Thone (BS,Or).
Taille maximale : 300 cm . Commun : 60 à 150 cm.
Engins de capture : Palangres ; traines ; sennes ; filets maillants ; lignes ; madrague ; chaluts pélagiques.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à juillet.
Régime alimentaire : Prédateur vorace, nombreuses espèces de poissons, crustacés et céphalopodes.
Habitat : Pélagique surtout jeune, semi-pélagique adulte ; fréquente surtout les eaux côtières à l'état adulte, les jeunes pouvant se pêcher au large dans les eaux claires ; Migrateur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 XII-XV, D2 I-II 12-14+8-10 ; A II-III 11-12+7-9.



Description :

– Corps trapu et massif, bleu foncé à flancs plus clairs et ventre argenté.
– Deux dorsales, la seconde plus courte et plus haute suivie de huit à dix pinnules.
– Anale suivie de sept à neuf pinnules.
– Pinnules jaunes bordées de noir.
– Pectorale courte, n'atteignant pas la deuxième dorsale.

Famille : SCOPHTHALMIDAE

Espèce : Lepidorhombus boscii (Risso, 1810).
Synonymes : – Pleuronectes boscii Risso, 1810.

Nom F.A.O : Cardine à quatre tâches.
Noms locaux : Fausse limande.
Taille maximale : 40 cm ; Commune de 10 à 30 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Surtout petits poissons, et aussi Crustacés et Mollusques Céphalopodes.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux du plateau continental et du talus jusqu'à plus de 700 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 72-87 ; A 60-69.



Description :

– Poisson plat de couleur gris brun.
– Yeux à gauche.
– Deux taches noires sur l'arrière de la dorsale et de l'anale.
– Pelviennes à bases longues et égales.

Famille : SCOPHTHALMIDAE

Espèce : Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Cardine franche.
Noms locaux : Fausse limande (BS,Al,B,An).
Taille maximale : 60 cm ; Commune de 20 à 30 cm.
Engins de capture : Chaluts et filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Fin d'hiver.
Régime alimentaire : Surtout de petits poissons, et aussi de calmars et de Crustacés.
Habitat : Benthnique, sur fonds vaseux du plateau continental et du talus jusqu'à environ 500 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 80-94 ; A 61-75.



Description :

- Poisson plat de couleur gris brunâtre légèrement taché.
- Yeux à gauche.
- Crête osseuse séparant les yeux.
- Caudale terminée en pointe.
- Nageoires avec des petites taches sombres très légères.
- Pelviennes à bases longues et égales.

Famille : SCOPHTHALMIDAE

Espèce : Psetta maxima (Linné, 1758).
Synonymes : – Scophthalmus maximus (Linné, 1788).
– Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1811).

Nom F.A.O : Turbot.
Noms locaux : Turbot (Al,BS,Or,An,Gh,BH,K) ; Hebo, Bourrourou, Turbot, Corbeau (B).
Taille maximale : 100 cm ; Commune de 40 à 50 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; palangres de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Surtout poissons, accessoirement mollusques, Crustacés et polychètes.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux et sablo-vaseux du plateau continental, rarement au delà.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 57-71 ; A 42-56.



Description :

– Poisson plat au corps quasi circulaire, à nombreux tubercules osseux en forme de tête de clou sur la face pourvue d'yeux.
– Coloration variable, brune plus ou moins claire.
– Ligne latérale apparente sur les deux faces.
– Pelviennes à bases longues et subégales.

Famille : SCOPHTHALMIDAE

Espèce : Scophthalmus rhombus (Linné, 1758).
Synonymes : – Rhombus laevis Turton, 1820.

Nom F.A.O : Barbue.
Noms locaux : Barbue (BS,B,An) ; Barbue, Sidi-Moussa (Al) ; Turbot (Gh, BH).
Taille maximale : 75 cm ; Commune de 20 à 40 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Février à mars.
Régime alimentaire : Petits poissons, invertébrés benthiques et pélagiques.
Habitat : Benthique sur fonds sableux du plateau continental et parfois la partie supérieure du talus jusqu'à 200 m et plus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 72-84 ; A 53-65.



Description :

– Poisson plat au corps ovoide.
– Coloration brunâtre plus ou moins tachetée, parfois uniforme.
– Premiers rayons de la dorsale plus ou moins libres et ramifiés.
– Pelviennes à bases longues et subégales.

Famille : SCORPAENIDAE

Espèce : Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809).
Synonymes : – Helicolenus maderensis Goode et Bean, 1896.
– Sebastes imperialis Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Rascasse de fond.
Noms locaux : Ma'aza, Hmam el bhar (Al) ; Rascassa (BS,Or) ; Rascasse (B,An,Gh,BH,K).
Taille maximale : 35 cm. Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Automne et hiver.
Régime alimentaire : Poissons, invertébrés pélagiques et benthiques.
Habitat : Benthique de préférence sur fonds vaseux, plus rarement sableux ou graveleux ; les jeunes fréquente le plateau à partir de 50 m environ de profondeur, les adultes le talus jusqu'à 800, parfois plus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII, 9-11 ; A III , 5-6 ; P 16-18.



Description :

– Corps trapu avec une tête cuirassée armée d'épines.
– Coloration rouge-jaunâtre parfois lavée de blanc, avec des bandes sombres verticales plus ou moins marquées selon l'état de fraicheur après la capture.
– Tache bleutée sur l'arrière de l'opercule et sur la partie postérieure de la partie épineuse de la dorsale.
– Fond de la bouche bleu très foncé.
– Extrémité des rayons de la partie inférieure de la pectorale libres.

Famille : SCORPAENIDAE

Espèce : Scorpaena elongata Cadenat, 1943.
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Rascasse rose.
Noms locaux : Rascasse (Al,B,An,Gh,BH,K) ; Scorpa (BS).
Taille maximale : 60 cm. Commun : 20 à 50 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Fin de l'été au début du printemps.
Régime alimentaire : Crustacés et poissons.
Habitat : Benthique, fréquentant surtout les fonds vaseux mais accidentés du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus d'environ 70 m à 500 - 600 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII , 8-10 ; A III , 5 ; P 18-20.



Description :

- Corps allongé, ramassé dans sa partie antérieure.
- Tête massive cuirassée, allongée, épineuse avec des lambeaux cutanés bien développés autour de la bouche, sur la ligne latérale et sur l'orbite oculaire.
- Coloration rose orangée.
- Caudale et pectorales arrondies à l'extrémité.

Famille : SCORPAENIDAE

Espèce : Scorpaena notata Rafinesque, 1810.
Synonymes : – Scorpaena ustulata Lowe, 1840.
– Scorpaena scrofa afimbria Slatenenko, 1934.

Nom F.A.O : Petite rascasse.
Noms locaux : Rascasse (Al,B,An,Gh,BH,K) ; Rascassa (BS).
Taille maximale : 24 cm. Commun : 12 à 16 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Probablement en mai.
Régime alimentaire : Crustacés et petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds variés du plateau continentale et du bord du talus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII , 9-10 ; A III , 5-6 ; P 17-19.



Description :

– Corps trapu de couleur brun - rougeâtre.
– Tête très épineuse avec un œil bien développé.
– Petit lambeau cutané et épines sur l'orbite oculaire.
– Pas de lambeaux cutanés mentonniers.
– Tache noire entre les huitième et dixième rayons durs de la dorsale.

Famille : SCORPAENIDAE

Espèce : Scorpaena porcus Linné, 1758.
Synonymes : – Cottus massiliensis Gmelin, 1788.
– Scorpaena rascassa Lacepède, 1801.

Nom F.A.O : Rascasse brune.
Noms locaux : Rascasse (Al,B,An,Gh,BH,K) ; Rascassa (BS).
Taille maximale : 25 cm. Commun : 15 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à août.
Régime alimentaire : Petits poissons (gobies, blennies), Crustacés et autres invertébrés.
Habitat : Benthique, fréquente surtout les herbiers et fonds durs côtiers, plus rarement le plateau continental jusqu'au talus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII , 9-11 ; A III , 5-6 ; P 16-18.



Description :

– Corps assez trapu de couleur brun foncé ou brun rougâtre avec des bandes transversales sombres plus ou moins marquées.
– Deux lambeaux cutanés sus-oculaires le deuxième plus développé.
– Pas de lambeaux cutanés mentonniers.

Famille : SCORPAENIDAE

Espèce : Scorpaena scrofa Linné, 1758.
Synonymes : – Scorpaena lutea Risso, 1810.
– Scorpaena barbata Lacepède, 1801.

Nom F.A.O : Rascasse rouge.
Noms locaux : Rascasse (Al,B,An,Gh,BH,K) ; Rascassa (BS).
Taille maximale : 50 cm. Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Mai à août.
Régime alimentaire : Crustacés, poissons (gobies) et mollusques
Habitat : Benthique, fréquente les fonds durs ou rocheux du plateau continental et de son bord jusque vers 150 - 200 m, rarement au delà.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII , 9-10 ; A III , 5-6 ; P 18-20.



Description :

– Corps assez trapu.
– Tête massive, relativement courte, cuirassée très épineuse, avec des lambeaux cutanès sus-oculaires, sur le museau et les mâchoires.
– Lambeaux cutanés sur la ligne latérale.
– Coloration rougeâtre assez foncée ; tache noire fréquente et bien marquée sur la dorsale.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Epinephelus aeneus (E. Geoffroy St-Hilaire, 1817).
Synonymes : – Serranus aeneus E. Geoffroy St-Hilaire, 1817.

Nom F.A.O : Mérou blanc.
Noms locaux : Mérou (Al,BS,An) ; Mérou voleur (B).
Taille maximale : 115 cm. Commun : 30 à 80 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; trémails ; chaluts ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite protogynique.
Période de reproduction : Printemps et en été.
Régime alimentaire : Prédateur vorace (poissons, Céphalopodes et Crustacés.
Habitat : Fonds sableux, sablo-vaseux et d'herbiers, côtier sur plateau (pénètre dans les lagunes), rarement plus au large.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI , 15-17 ; A III , 7-9.



Description :

– Corps allongé de couleur brune plus ou moins claire avec des reflets grisâtre ou verdâtre, avec parfois de larges bandes transversales sombres.
– Côtés de la tête marqués par deux à trois lignes blanches très nettes.
– Opercule avec une à trois épines.
– Caudale à extrémité arrondie.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 1828).
Synonymes : – Serranus alexandrinus (Valenciennes, 1828).

Nom F.A.O : Mérou badèche
Noms locaux : Abadèche, Badécha (Al) ; Bayajo (BS) ; Badèche (B,An.BH) ; Abadèche (Gh,K).
Taille maximale : 140 cm. Commun : 30 à 70 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; trémails ; chaluts ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Prédateur vorace (poissons, Céphalopodes et Crustacés.
Habitat : Fonds côtiers sabieux, vaseux, rocheux ou sur prairies, jusqu'à 50 - 60 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 16-18 ; A III, 8-9.



Description :

– Corps allongé, brillant, de couleur verdâtre ou brunâtre avec une grande tache jaunâtre sur le dos le long de la ligne latérale.
– Tête effilée avec deux lignes sombres operculaires plus ou moins visibles.
– Trois épines sur le haut de la partie postérieure de l'opercule.
– Caudale tronquée.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843).
Synonymes : – Cerna canina (Doderlein, , 1879).

Nom F.A.O : Mérou gris
Noms locaux : Mérot blanc (Al) ; Mérou (Gh,BH,K) ; Mérou blanc (An).
Taille maximale : 150 cm. Commun : 30 à 100 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; trémails ; chaluts ;
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Printemps et en été.
Régime alimentaire : Carnivore, surtout de poissons et d'invertébrés.
Habitat : Fonds détritiques du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus (de 80 à 300 - 400 m) ; les très jeunes individus peuvent être pêchés sur le plateau.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 13-16 ; A III, 8-9.



Description :

- Corps assez trapu et haut de couleur brune ; jeunes marqués de lignes longitudinales foncées.
- Deux bandes sombres débutant à l'arrière de l'œil jusqu'à la partie postérieure de l'opercule.
- Caudale tronquée.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Epinephelus guaza (Linné, 1758).
Synonymes : – Epinephelus gigas (Brunnich, 1768).
– Serranus gigas (Brunnich, 1768).

Nom F.A.O : Mérou noir
Noms locaux : Mérou brun, Al marra (Al) ; Mérou (BS,Gh,BH,K) ; Mérou jaune (B) ; Merot (An).
Taille maximale : 100 cm. Commun : 30 à 80 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; trémails ; chaluts ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite protogynique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Prédateur vorace, carnassier (poissons, céphalopodes et crustacés.
Habitat : Fonds côtier rocheux et sableux, peut se pêcher jusque vers 100 - 150 m dans les zones accores.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 15-16 ; A III, 8-9.



Description :

– Corps trapu et robuste.
– Coloration brun foncé avec parfois des taches plus claires sur le dos, les flancs, la gorge ; ventre de couleur orangée avec des reflets sombres.
– Opercule avec trois épines à l'arrière.
– Caudale tronquée, bordée de blanc.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Polyprion americanus (Bloch et Schneider, 1801).
Synonymes : – Polyprion americanum (Bloch et Schneider, 1801).
– Polyprion cernium Valenciennes, 1824.

Nom F.A.O : Cernier commun
Noms locaux : Cernier, Al marra, Mérou (Al) ; Cherna (BS,Or) ; Chernice (B) ; Merot (An) ; Mérou (Gh,BH,K).
Taille maximale : 200 cm. Commun : environ 80 cm.
Engins de capture : Lignes ; palangres ; trémails ; chaluts.
Sexualité : Hermaphrodite .
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Carnivore (crustacés, mollusques et aussi de poissons.
Habitat : Necto-benthique, surtout sur la pente continentale dans les endroits accidentés, mais sur fonds sableux ou vaseux ; les jeunes sont pélagique, on les trouve sous les épaves en surface.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 11-13 ; A III, 8-10.



Description :

– Corps assez trapu et assez haut.
– Coloration grise assez claire, les jeunes étant brun verdâtre foncé.
– Tête massive à profil supérieur bosselé et une mâchoire inférieure proéminente.
– Crête osseuse sur la partie supérieure de l'opercule.
– Caudale à extrémité arrondie bordée de blanc.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Serranus atricauda (Günther, 1874).
Synonymes : – Paracentropristis atricauda (Günther, 1874).

Nom F.A.O : Serran à queue noire.
Noms locaux : Sarran (Al,An,BH,K) ; Sarrano (BS) ; Sarran-Zalamite (B) ; Serranow (Gh).
Taille maximale : 35 cm. Commun : 20 à 30 cm.
Engins de capture : Lignes ; trémails ; chaluts.
Sexualité : Hermaphrodite synchrone.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Carnivore (poissons et invertébrés).
Habitat : Fonds rocheux surtout insulaires jusqu'à environ 100 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 15 ; A III, 8.



Description :

– Corps élancé, de couleur brun rougeâtre avec quatre à cinq tâches sombres rectangulaires séparées par des bandes claires.
– Rayures sombres sur les joues.
– Trois épines operculaires rapprochées.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Serranus cabrilla (Linné , 1758).
Synonymes : – Paracentropristis cabrilla (Linné, 1758).

Nom F.A.O : Serran chèvre.
Noms locaux : Sarran (Al,An,BH,K) ; Sarrano (BS,Or) ; Sarran-Zalamite (B) ; Serranow (Gh).
Taille maximale : 40 cm. Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Lignes ; trémails ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite synchrone.
Période de reproduction : Avril et juillet.
Régime alimentaire : Prédateur vorace (poissons, Céphalopodes et Crustacés).
Habitat : Fonds divers durs, sableux, sablo-vaseux et herbiers du plateau continental, parfois sur la partie supérieure du talus ; ne dépasse guère 200 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 13-15 ; A III, 7-8.



Description :

- Corps élancé.
- Coloration brun rougeâtre avec des reflets jaunes et orangés et des bandes sombres sur le dos.
- Deux à trois bandelettes longitudinales sombres sur le ventre.
- Trois lignes obliques jaunes du dessus de la bouche à l'insertion des pectorales.
- Trois épines operculaires rapprochées.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Serranus hepatus (Linné , 1758).
Synonymes : – Labrus hepatus (Linné, 1758).
– Holocentrus siagonotus Delaroche, 1809.

Nom F.A.O : Serran tambour.
Noms locaux : Serdouk, Castagnole rouge (Al) ; Sarrano (BS). Sarran-Zalamite (B) ; Sarran (An, BH, K) ; Serranow (Gh).
Taille maximale : 25 cm. Commun : 10 à 15cm.
Engins de capture : Lignes ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite synchrone.
Période de reproduction : Mars à août.
Régime alimentaire : Carnivore (poissons et invertébrés).
Habitat : Fonds vaseux du plateau continental et de son bord, pêché parfois près des roches ; de la côte à 180 - 200 m de profondeur.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 11-13 ; A III, 7.



Description :

– Corps trapu relativement élevé, de couleur brune avec quatre à cinq bandes transversales, les deux dernières se prolongeant sur le ventre.
– Tache noire à la naissance de la partie molle de la dorsale.
– Trois épines operculaires rapprochées.

Famille : SERRANIDAE

Espèce : Serranus scriba (Linné , 1758).
Synonymes : – Holocentrus argus Spinola, 1807.

Nom F.A.O : Serran écriture.
Noms locaux : Sarran (Al,An,BH,K), Sarrano (BS,Or) ; Sarran-Zalamite (B) ; Serranow (Gh).
Taille maximale : 35 cm. Commun : 15 à 25cm.
Engins de capture : Lignes ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite synchrone.
Période de reproduction : Avril à septembre.
Régime alimentaire : Prédateur vorace (poissons, crustacés et mollusques).
Habitat : Fonds rocheux et herbiers côtiers.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 14-16 ; A III, 7-8.



Description :

– Corps élancé, assez haut.
– Dos de couleur brique avec cinq à sept bandes verticales sombres ; ventre marqué par des taches violacées.
– Tête marquée de lignes réticulées bleu-sombre (chez le mâle).
– Trois épines operculaires rapprochées.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888).
Synonymes : – Solea profundicola Vaillant, 1888.

Nom F.A.O : Sole des profondeurs.
Noms locaux : Sole (Gh,BS,BH,Al,B,An,K).
Taille maximale : 21 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Toute l'année.
Régime alimentaire : Polychètes et amphipodes.
Habitat : Benthique sur fonds à dominance vaseuse du talus continental d'environ 200 à 600 m et plus ; fréquent et abondant en Algérie orientale.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 75-89 ; A III, 61-71.



Description :

– Poissons plat au corps ovale.
– Yeux à droite.
– Coloration brune plus ou moins marquée de zones plus sombres.
– Dorsale et anale brun-noirâtre ourlées de blanc.
– Pectorale de la face aveugle absente ou rudimentaire.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Buglossidium luteum (Risso 1810).
Synonymes : – Solea lutea Risso, 1810.

Nom F.A.O : Petite sole jaune.
Noms locaux : Sole, Reqiqa (Al) ; Sola (BS).
Taille maximale : 15 cm, commune de 6 à 10 cm.
Engins de capture : Chaluts ; sennes ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Hiver.
Régime alimentaire : Invertébrés variés.
Habitat : Benthique sur fonds sableux, surtout côtiers.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 65-78 ; A 49-60.



Description :

– Poissons plat au corps ovale et allongé.
– Yeux à droite.
– Coloration brun-doré avec des taches sombres en séries longitudinales.
– Dorsale et anale présentant régulièrement sur toute leur longueur un rayon sombre. Membrane reliant ces deux nageoires à la caudale.
– Pas de pectorale sur la face aveugle.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Dicologoglossa cuneata ([de la Pylaie] Moreau, 1881).
Synonymes : – Solea cuneata Moreau, 1881.
– Solea angulosa Kaup, 1858.

Nom F.A.O : Céteau.
Noms locaux : Languette, Sole (Al) ; Iless (B) ; Languita (Gh) ; Sole (BS,Or,An,K) ; Elsène (BH).
Taille maximale : 30 cm, commune de 7 à 22 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Automne-hiver.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux et sablo-vaseux du plateau continental (optimum de 10 à 50 m de profondeur).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 81-95 ; A 65-72.



Description :

– Poisson plat au corps effilé.
– Yeux à droite.
– Coloration brun-sombre.
– Petite membrane reliant les nageoires dorsale et anale avec la caudale.
– Pectorale de la face oculée avec une petite tache noire sur l'extrémité postérieure.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Microchirus azevia (Capello, 1867).
Synonymes : – Zevaia theophila Blache et al.,1970.
– Dicologlossa azevia Chabanaud, 1927.

Nom F.A.O : Sole-perdrix juive.
Noms locaux : Sole (BH,Al,B,An,K) ; Linguao (BS).
Taille maximale : 40 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à août.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds détritiques du plateau continental de la côte jusqu'à 200 m au moins.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 71-86 ; A 58-68.



Description :

– Poisson plat au corps ovale.
– Yeux à droite.
– Coloration brun-sombre.
– Dorsale et anale sombres en bordure et ourlées de blanc.
– Pas de membrane reliant ces deux nageoires à la caudale.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Microchirus variegatus (Donovan, 1802).
Synonymes : – Pleuronectes microchirus Delaroche, 1809.
– Monochirus lingula O.G Costa, 1847-1848.

Nom F.A.O : Sole-perdrix commune.
Noms locaux : Sole (Gh,BS,BH,Al,B,An,K).
Taille maximale : 20 cm, commune de 12 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds à tendance sableuse, sable grossier surtout sur le plateau continental jusqu'à environ 200 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 63-77 ; A 51-64.



Description :

– Poisson plat au corps ovale assez allongé.
– Yeux à droite.
– Coloration brune ou grise avec des bandes transversales sombres se continuant sur la dorsale et l'anale leur donnant un aspect plus sombre.
– Pectorale de la face aveugle moins développée que celle de la face oculée.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Solea kleini (Risso) Bonaparte, 1833.
Synonymes : – Pegusa kleini (Bonaparte, 1833).
– Synapturichthys kleini (Bonaparte, 1833).

Nom F.A.O : Sole tachetée.
Noms locaux : Sole (BS,BH,Al,B,An,).
Taille maximale : 40 cm, commune de 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds sableux et vaseux du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 72-91 ; A 57-74.



Description :

– Poisson plat au corps ovale.
– Yeux à droite.
– Coloration sable, mélée de plages sombres et claires.
– Narine antérieure de la face aveugle en forme de cupule et séparée de la narine postérieure.
– Pectorale de la face oculée avec une tache noire en position centrale et bordée de blanc.
– Membrane unissant la dorsale et l'anale à la caudale.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Solea lascaris (Risso, 1810).
Synonymes : – Pegusa lascaris (Risso, 1810).

Nom F.A.O : Sole pole.
Noms locaux : Sole (BS,BH,Al,B,An,K) ; Sola (Gh).
Taille maximale : 40 cm, commune de 15 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps-été.
Régime alimentaire : Essentiellement de mollusques bivalves, de crustacés et de polychètes.
Habitat : Benthique sur fonds détritiques du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 70-90 ; A 58-75.



Description :

– Poisson plat au corps ovale ; narine en forme de rosette sur la face aveugle.
– Yeux à droite.
– Coloration jaunâtre avec des tâches sombres.
– Pectorale de la face oculée avec une tache noire centrale sur l'extrémité postérieure.
– Rayons brunâtres régulièrement répartis sur la dorsale et l'anale.
– Dorsale et anale unies à la caudale par une petite membrane.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Solea nasuta (Pallas, 1811).
Synonymes : – Pegusa nasuta (Pallas, 1811).

Nom F.A.O : Sole de mer Egée.
Noms locaux : Sole (Gh,BS,Or,BH,Al,B,An,K) ;
Taille maximale : 25 cm, commune de 10 à 16 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Avril à septembre.
Régime alimentaire : Invertébrés benthiques.
Habitat : Benthique sur fonds sableux dans les eaux-côtières.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 67-76 ; A 54-61.



Description :

– Poisson plat au corps ovale.
– Yeux à droite.
– Coloration brun-foncé avec des tâches sombres plus ou moins diffuses.
– Tache noire au centre de la pectorale de la face oculée.
– Narine antérieure de la face oculée tubulaire, celle de la face aveugle élargie en rosette.
– Dorsale et anale unies à la caudale par une petite membrane.

Famille : SOLEIDAE

Espèce : Solea vulgaris Quensel, 1806.
Synonymes : – Solea solea Jordan et Goss, 1889.

Nom F.A.O : Sole commune.
Noms locaux : Sole (BH,Al,B,An,K) ; Sola, Palaya (BS) ; Pilova (Gh).
Taille maximale : 70 cm, commune de 15 à 45 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants de fond.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à août.
Régime alimentaire : Vers polychètes, mollusques et petits crustacés.
Habitat : benthique sur fonds vaseux et sablo-vaseux du plateau continental et de la partie supérieure du talus jusqu'à 300 m de profondeur environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 71-97 ; A 53-80.



Description :

- Poisson plat au corps ovale assez allongé.
- Yeux à droite.
- Coloration brun roux avec des marbrures foncées.
- Pectorale de la face oculée à rayons supérieurs plus longs et présentant une tache noire.
- Dorsale et anale unies à la caudale par une membrane développée.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Boops boops (Linné, 1758).
Synonymes : – Box boops (Linné, 1758).
– Box vulgaris Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Bogue.
Noms locaux : Bougga (Al,BS,Or,B,Gh,BH,K) ; Vope, Vopa (An).
Taille maximale : 35 cm, commune de 15 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodisme potentiel.
Période de reproduction : Avril-mai.
Régime alimentaire : Omnivore, surtout planctonophage ; les jeunes surtout carnivores.
Habitat : Comportement pélagique ; forme des bancs sur le plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XIII-XV, 12-16 ; A III, 14-16.



Description :

– Corps fusiforme de couleur grisâtre avec des reflets dorés et bleutés ; flancs et ventre argentés.
– Tache bleue foncée à l'aisselle de la pectorale.
– Ligne latérale foncée.
– Dents incisiformes en une seule rangée aux deux mâchoires.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Dentex dentex (Linné, 1758).
Synonymes : – Dentex vulgaris (Valenciennes, 1830).

Nom F.A.O : Denté commun.
Noms locaux : Dentti (Al,BH,Gh) ; Dentch, Denge (B) ; Dentch (An,K).
Taille maximale : 100 cm pour plus de 12 kgs.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; nasses ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Poissons ; mollusques céphalopodes.
Habitat : Fonds rocheux côtiers, surtout jusqu'à 50 m en été, en hiver jusqu'à 200 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI - 11-12 ; A III, 7-9.



Description :

– Corps élancé, assez élevé et comprimé.
– Tête au profil assez effilé.
– Coloration variable selon l'âge, gris rosé plus ou moins foncé avec des taches bleues ou vertes sur le dos et les flancs.
– Dents caniniformes, les quatre à six antérieures en crocs.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810).
Synonymes : – Dentex filosus (Valenciennes, 1843).

Nom F.A.O : Gros denté rose.
Noms locaux : Pompier (Al,Or,An,K) ; Bossu (B) ; Bousnane, Chama (BS) ; Bouricha (j.i) ; Dendu (Gh) ; Denti (j.i) ; Pagre bossu (adulte) (BH).
Taille maximale : 100 cm .
Engins de capture : Chaluts ; nasses ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Carnivore, Crustacées - Poissons Céphalopodes.
Habitat : Fréquente les fonds de nature diverse du plateau continental jusqu'à 150 - 200 m ; en Algérie sa fréquence augmente nettement d'ouest en est ; recherche les eaux relativement chaudes.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII - 10-11 ; A III, 7-9.



Description :

– Corps assez comprimé, de couleur rosâtre.
– Tête assez massive avec une bosse frontale chez les individus âgés.
– Dents caniniformes, celles de l'avant en crocs robustes.
– Tache noire en arrière de la partie molle de la dorsale.
– Tache violacée à l'aisselle de la pectorale.
– Extrémité de la caudale bordée de noir.
– Deux premiers rayons durs trés courts, les suivants aux extrémités filamenteuses chez les jeunes.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Dentex maroccanus Valenciennes, 1830.
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Denté du Maroc.
Noms locaux : Betsoune, Bet sol (B) ; Cocotte (An).
Taille maximale : 45 cm . commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Juin à août.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Necto-benthique sur fonds variés du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus (50 - 250 m, optimum 150 - 200 m) ; jamais observé en Algérie occidentale, assez rare au centre, très commun en Algérie orientale surtout à l'est d'Annaba.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII - 10-11 ; A III, 8-9.



Description :

- Corps trapu de couleur rougeâtre sur le dos, plus claire sur les flancs avec des reflets argentés.
- Dents caniniformes, les crocs à développement identique sur les deux mâchoires.
- Fourche de la caudale bordée de rouge.

* Très souvent confondu avec *D. macrophthalmus,* les citations de ce dernier en Algérie sont douteuses.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Diplodus annularis (Linné, 1758).
Synonymes : – Sparus annularis (Linné, 1758).

Nom F.A.O : Sparaillon commun.
Noms locaux : Sparaillon (Al) ; Sargo (BS) ; Sparle (An) ; Raspaillon(O,BH) ; Sar (Gh, K).
Taille maximale : 18 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodisme rudimentaire.
Période de reproduction : Février à septembre.
Régime alimentaire : Vers, crustacés, mollusques, algues, échinodermes, hydrozoaires.
Habitat : Côtier ; herbiers à posidonies et fonds meubles jusqu'à 100 m environ.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI - 13-13 ; A III, 11-12.



Description :

– Corps ovale, trapu, assez haut.
– Coloration grise à reflets jaune-canari et argentés ; extrémités des nageoires teintées de jaune, ventre blanc.
– Incisives larges avec deux à quatre rangées de molaires sur les deux mâchoires.
– Tache sombre en forme d'anneau sur le pédoncule caudal.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Diplodus cervinus (Lowe, 1838).
Synonymes : – Sargus cervinus Doderlein, 1891.
– Diplodus trifasciatus Lozano Rey, 1952.

Nom F.A.O : Sar à grosses lèvres.
Noms locaux : Sargo (An) ; Sar (BH) ; Tambour (Al).
Taille maximale : 55 cm. Commun. 35 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; nasses ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Estivale.
Régime alimentaire : Omnivore (petits invertébrés et algues).
Habitat : Fonds rocheux de la côte à 80 - 100 m, surtout à moins de 50 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII, 11-14 ; A III, 10-12.



Description :

– Corps ovale, trapu et élevé.
– Coloration gris-rosâtre à reflets dorés. Cinq bandes verticales brun-rougeâtre la première en avant de la dorsale, la dernière en anneau sur le pédoncule caudal.
– Tête à museau assez effilé avec des lèvres épaisses.
– Une dizaine d'incisives sur la mâchoire supérieure, huit sur la mâchoire inférieure, une à trois rangées de petites molaires aux deux mâchoires.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Diplodus sargus (Linné, 1758).
Synonymes : – Sargus sargus Linné, 1758.
– Sargus rondeleti Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Sar commun.
Noms locaux : Bousnane, Al Kantchour (Al) ; Sargo, Tambour (BS,Or) ; Sparle (An) ; Sargo (Gh) ; Bousnane (BH) ; Sar (K).
Taille maximale : 40 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite protandre.
Période de reproduction : Mars-Juin.
Régime alimentaire : Jeunes omnivores ; adultes carnivores.
Habitat : Fonds rocheux et herbiers côtiers.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XI, 13-15 ; A III, 12-14.



Description :

– Corps ovale, élevé et comprimé.
– Coloration grisâtre à reflets argentés ; huit à neuf bandes verticales sombres traversées par des rayures sombres, plus fines longitudinales, tache noire sur le pédoncule caudal.
– Huit incisives sur chaque mâchoire et trois à quatre rangées de molaires supérieures et deux à trois rangées inférieures.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Diplodus vulgaris (E. Geoffroy St Hilaire, 1817).
Synonymes : – Sargus vulgaris E. Geoffroy St Hilaire, 1817.
– Sargus salviani Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Sar à tête noire.
Noms locaux : Sar (Al,B,BH,K) ; Bidrilla (BS) ; Sparle (An) ; Sargo (Gh).
Taille maximale : 45 cm. Commun. 25 cm
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodisme rudimentaire.
Période de reproduction : Automne.
Régime alimentaire : Carnivore (Mollusques, Crustacés, Bryozoaires, Echinodermes, Vers).
Habitat : Fonds de gravier, de sable et de vase près des roches jusqu'à 150 - 200 m ; jeunes dans les herbiers.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII, 13-16 ; A III, 12-15.



Description :

– Corps ovale, comprimé et assez élevé.
– Coloration gris-argenté à ventre plus clair avec une large tache noire sur la nuque et un anneau noir sur le pédoncule caudal.
– Bouche en forme de bec avec huit incisives étroites sur chaque mâchoire ; molaires supérieures sur trois à cinq rangées, les inférieures sur deux à quatre rangées.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Lithognathus mormyrus (Linné, 1758).
Synonymes : – Pagellus mormyrus (Linné, 1758).
– Sparus mormyrus Linné, 1758.

Nom F.A.O : Marbré.
Noms locaux : Marbré, Asqqoum, Menkous (Al) ; Marbré (B) ; Kahli (An) ; Marbré (Gh,Or,BH,K).
Taille maximale : 55 cm. Commun : 15 à 30 cm.
Engins de capture : Lignes ; chaluts ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite protandrique.
Période de reproduction : Printemps et en été.
Régime alimentaire : Carnivore (vers, mollusques, petits crustacés et oursins).
Habitat : Fonds sableux et sablo-vaseux (s'enfonce dans le sédiment) côtier ; pénètre dans les lagunes et étangs salés.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XII, 11-12 ; A III, 10-11.



Description :

– Corps assez élancé.
– Tête à museau allongé avec des lèvres un peu épaissies.
– Coloration gris-argenté avec une douzaine de lignes verticales sombres.
– Dents en bande en avant suivies de molaires sur plusieurs rangées.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Oblada melanura (Linné, 1758).
Synonymes : – Sparus malanurus (Linné, 1758).

Nom F.A.O : Oblade.
Noms locaux : Doblade, El Kahla (Al) ; Kahla (B) ; Dobla (BS) ; Kahli (AN) ; El-kahla (Gh) ; Doblade (BH).
Taille maximale : 30 cm. Commun : 15 à 25 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite progynique.
Période de reproduction : Avril à juin.
Régime alimentaire : Omnivore (surtout petits crustacés).
Habitat : Côtier près des fonds rocheux, herbiers, dans les ports, estuaires, etc...
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 13-14 ; A III, 12-14.



Description :

– Corps ovoide assez trapu de couleur gris-bleuâtre avec des reflets argentés.
– Une rangée externe des dents tranchantes suivie de petites dents en carde.
– Tache noire en forme de selle entourée de blanc sur le pédoncule caudal.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Pagellus acarne (Risso, 1826).
Synonymes : Néant.

Nom F.A.O : Pageot acarné.
Noms locaux : Boumechita (B) ; Bizigo (BS) ; Bezougue (Or,BH,Al) ; Chpigarel (An) ; Mafroune (Gh,A,An,K).
Taille maximale : 35 cm. Commun : 15 à 25 cm
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite protandrique.
Période de reproduction : Septembre à novembre.
Régime alimentaire : Omnivore à prédominance carnivore ; vers, mollusques, petits crustacés.
Habitat : Comportement semi-pélagique ; peut être capturé en quantité importante à une certaine distance du fonds ; fréquente le plateau continental sur des fonds variés, le plus souvant détritiques, parfois la partie supérieure du talus jusqu'à environ 500 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII, 10-12 ; A III, 9-10.



Description :

- Corps fusiforme de couleur sable, avec des reflets rosâtres ou brunâtres à l'état frais.
- Tache rouge sombre à l'aisselle de la pectorale.
- Dents pointues à l'avant et molariformes à l'arrière.
- Fond de la cavité buccale orangée.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768).
Synonymes : – Pagellus centrodentus (Delaroche, 1809).
– Sparus bogaraveo (Brünnich, 1768).

Nom F.A.O : Dorade rose.
Noms locaux : Pageot (An, K) Gros yeux (B, Gh) ; Patchano (BS) ; Gros yeux, Merdjane (BH) ; Gros yeux, Manfroum, Merdjane (Al).
Taille maximale : 65 cm. Commun 15 à 35 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; palangres ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite protandrique.
Période de reproduction : Eté.
Régime alimentaire : Omnivore à prédominance carnivore. Invertébrés pélagiques, larves et œufs.
Habitat : Fonds principalement vaseux ou sablo-vaseux du plateau continental à partir de 15 - 20 m pour les jeunes, et du bord du plateau et du talus pour les adultes jusqu'à 700 - 800 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII, 11-13 ; A III, 11-12



Description :

– Corps trapu avec une tête assez massive, museau obtus.
– Coloration rosâtre, dos plus foncé, ventre blanc.
– Yeux bien développés.
– Tache noire à la naissance de la ligne latérale bien marquée chez les adultes.
– Dernier rayon mou de la dorsale et de l'anale plus forts que les précédents.
– Bouche avec des dents pointues à l'avant et en molaires l'arrière, l'intérieur de celle-ci de couleur orangée.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Pagellus erythrinus (Linné, 1758).
Synonymes : – Pagellus erythrinus Linné, 1758.
– Pagellus canariensis Valenciennes, 1838.

Nom F.A.O : Pageot commun.
Noms locaux : Pageot (Gh,BS,Or,BH,B,An,K) ; Pageot, El Bejjij (Al).
Taille maximale : 60 cm. Commun 20 à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite protogynique.
Période de reproduction : Printemps à automne.
Régime alimentaire : Omnivore à prédominance carnivore ; petits poissons, invertébrés benthiques.
Habitat : Fonds variés du plateau continental, parfois à une certaine distance du fonds, de la côte jusqu'à environ 200 - 300 m ; vit souvent en groupe.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII-XIII, 10-11 ; A III, 8-9.



Description :

– Corps ovale assez comprimé de couleur générale rose, plus vif et plus foncé sur le dos ; points bleus sur le dos et les flancs visible à l'état frais.
– Bord postérieur de l'opercule rouge carmin.
– Tache rougeâtre à la base des pectorales ; tache en dessous du dernier rayon de la dorsale chez l'adulte.
– Intérieur de la bouche blanchâtre ou grisâtre.
– Dents pointues à l'avant suivies de dents molariformes à l'arrière.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830).
Synonymes : – Sparus caeruleostictus (Valenciennes, 1830).

Nom F.A.O : Pagre à points bleus.
Noms locaux : Fiancé (An).
Taille maximale : 90 cm. Commune de 20 à 50 cm.
Engins de capture : Chaluts ; lignes ; palangres.
Sexualité : Hermaphrodite protogynique.
Période de reproduction : Printemps et automne.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Fonds durs, roches et conglomérats, dans les eaux chaudes côtières.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI-XIII, 9-11 ; A III, 8-9.



Description :

- Corps trapu assez élevé de couleur rose à reflets argentés avec des petites taches bleu-noir sur le dos et les flancs.
- Deux premiers rayons durs de la dorsale très courts, les troisième à cinquième plus longs et filamenteux chez l'adulte.
- Premier rayon mou des pelviennes filamenteux.
- Tache sombre à la base des derniers rayons mous de la dorsale.
- Quatre dents supérieures et six dents inférieures caniniformes à l'avant, suivies de molaires.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Pagrus pagrus pagrus (Linné, 1758).
Synonymes : – Sparus Pagrus pagrus (Linné, 1758).
– Pagrus pagrus (Linné, 1758).
– Pagrus vulgaris Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Pagre commun.
Noms locaux : Pagre (B,An,BH) ; Pagré (BS,Or) ; Pagre, Al badhar (Al) ; Pagri (Gh) ; Pray (K).
Taille maximale : 75 cm. Commun : 20 à 50 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Avril à juin.
Régime alimentaire : Carnivore plus ou moins broyeur (crustacés, mollusques et poissons).
Habitat : Fonds divers du plateau continental, les jeunes plus près de la côte ; migrations automnales.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XII, 9-12 ; A III, 8-9.



Description :

– Corps ovale assez élevé de couleur rose à reflets argentés.
– Tache sombre peu marquée à l'aisselle des pectorales.
– Extrémités des lobes de la caudale blanches.
– Grandes canines antérieures en crocs, quatre supérieures et six inférieures.
– Molaires disposées sur deux à quatre rangs, les deux externes plus fortes.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Puntazzo puntazzo (Gmelin, 1789).
Synonymes : – Diplodus puntazzo (Cetti, 1777).
– Charax puntazzo Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Sar à museau pointu.
Noms locaux : Shaghre (B) ; Sar (BH) ; Becofino (Al).
Taille maximale : 60 cm. Commun : 30 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite.
Régime alimentaire : Omnivore (algues, vers, moules, crevettes).
Habitat : Côtier sur fonds durs ou rocheux, surtout jusqu'à environ 50 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 12-15 ; A III, 11-13.



Description :

– Corps ovale assez comprimé.
– Coloration gris-argenté avec six à sept bandes verticales sombres alternant avec cinq à sept bandes plus claires et plus courtes.
– Tâche noire en forme d'anneau sur le pédoncule caudal.
– Extrémité de la caudale bordée de noir.
– Bouche à l'aspect de bec, lèvres assez épaisses.
– Huit incisives inclinées vers l'avant suivies d'une à deux rangées de molaires rudimentaires.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Sarpa salpa (Linné, 1758).
Synonymes : – Boops salpa (Linné, 1758).
– Sparus salpa Linné, 1758.

Nom F.A.O : Saupe.
Noms locaux : Tchelbine, Tchelba (Al,B,BH) ; Chelba (An) ; Salpa (Gh) ; Saupe (K).
Taille maximale : 45 cm. Commun : 20 à 35 cm.
Engins de capture : Lignes ; sennes ; filets maillants.
Sexualité : Hermaphrodite protandrique.
Période de reproduction : Printemps et en automne.
Régime alimentaire : Jeunes planctonophages, adultes presque uniquement herbivores.
Habitat : Côtier, grégaire sur les fonds rocheux et d'herbier, les digues des ports, etc...
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI–XII, 14-17 ; A III, 13-15.



Description :

– Corps ovale assez comprimé avec une petite tête.
– Coloration grise avec une dizaine de lignes longitudinales dorées, ventre plus clair.
– Ligne latérale sombre.
– Petite tache sombre à l'aisselle des pectorales.
– Une seule rangée d'incisives aux deux mâchoires.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Sparus aurata (Linné, 1758).
Synonymes : – Sparus auratus (Linné, 1758).
– Chrysophrys aurata Valenciennes, 1830.

Nom F.A.O : Dorade royale.
Noms locaux : Dora (BS) ; Quadjoudj (Al) ; Dorade (B,Gh,BH,Or,K,An) .
Taille maximale : 75 cm. Commun : 25 à 60 cm.
Engins de capture : Chaluts ; palangres ; filets maillants ; harpons.
Sexualité : Hermaphrodite protandrique.
Période de reproduction : Hiver.
Régime alimentaire : Carnivore (mollusques, moules, crustacés et poissons).
Habitat : Fonds côtier détritiques et lagune en été ; s'éloigne plus au large en automne jusque vers 150 - 200 m, les jeunes restant dans la zone côtière.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 13-14 ; A III, 11-12.



Description :

– Corps ovale assez élevé et comprimé de couleur gris-argenté.
– Anneau doré entre les deux yeux.
– Grosse tache noire operculaire.
– Ligne noirâtre traversant la dorsale.
– Caudale bordée de noir.
– Quatre à six canines antérieures sur chaque mâchoire, avec deux à quatre rangées de molaires dont une à deux plus grandes.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Sparus auriga (Valenciennes, 1843).
Synonymes : – Pagrus auriga (Valenciennes, 1843).

Nom F.A.O : Pagre rayé.
Noms locaux : Pagre (B,An) ; Pagre rayé (Al) ; Pray (K).
Taille maximale : 60 cm. Commun : 25 à 35 cm.
Engins de capture : Chaluts ; filets maillants ; lignes..
Sexualité : Hermaphrodite.
Période de reproduction : Hiver.
Régime alimentaire : Carnivore (mollusques, bivalves et céphalopodes, crustacés).
Habitat : Fonds côtiers durs ou rocheux.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 10-12 ; A III, 8-9.



Description :

- Corps ovale assez élevé et trapu de couleur rose avec quatre à cinq bandes transversales rouge-brique à violacé.
- Deux premiers rayons durs de la dorsale très courts, suivis de trois rayons durs longs à extrémités filamenteuses.
- Dents antérieures caniniformes, quatre supérieures et six inférieures. Dents postérieures molariformes.

* Pour Lozano-Rey il s'agit du jeune de *P.coeruleostictus,* contesté par la suite.

Famille : SPARIDAE

Espèce : Spondyliosoma cantharus (Linné, 1758).
Synonymes : – Cantharus cantharus (Linné, 1758).
– Sparus cantharus Linné, 1758).

Nom F.A.O : Dorade grise.
Noms locaux : Charbonnier, Al faham (Al) ; Thopa (BS) ; Tamoude (B) ; Charbonnier (BH) ; Tanout (An).
Taille maximale : 60 cm. Commun : 20 à 40 cm.
Engins de capture : Lignes ; filets maillants ; nasses ; chaluts.
Sexualité : Hermaphrodite protogynique.
Période de reproduction : Février à mai.
Régime alimentaire : Omnivore (algues, petits invertébrés et surtout crustacés).
Habitat : Grégaire, sur le plateau continental jusque vers 150 - 200 m sur fonds divers, souvent durs ; les plus jeunes près de la côte.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D XI, 11-13 ; A III, 9-11.



Description :

– Corps ovale et comprimé.
– Coloration grise, dos brunâtre avec des lignes longitudinales brunâtres ou dorées sur les flancs, reflets bleus à l'état frais.
– Caudale bordée de noir.
– Profil de la tête déprimé au dessus des yeux.
– Quatre à six rangées de dents pointues, en carde à chaque mâchoire, celles de la rangée externe les plus grandes.

Famille : SPHYRAENIDAE

Espèce : Sphyraena sphyraena (Linné, 1758).
Synonymes : – Sphyraena spet Lacepède, 1803.
– Sphyraena vulgaris Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Bécune européenne.
Noms locaux : Brochet, Sirèn, La'alaz (Al) ; Broche (B) ; Brochet (BH,Gh,BS,An,K) ; Barracuda (Or).
Taille maximale : 165 cm ; Commune de 30 à 50 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Fin du printemps, été.
Régime alimentaire : Carnivore, (surtout poissons, céphalopodes et crustacés).
Habitat : Comportement pélagique chez l'adulte qui se regroupe parfois en bancs importants ; les jeunes vivent près du fonds ; fréquente la zone côtière surtout jusqu'au dessus des fonds de 70 - 80 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 1 V, D2 1 - 9 ; A I-9.



Description :

– Corps allongé à museau arrondi, obtus, la mâchoire inférieure légèrement proéminente.
– Coloration variable, du beige assez clair au brun olivâtre ou gris verdâtre avec des taches sinueuses plus sombres sur le dos et les flancs.
– Deux dorsales courtes et séparées ; caudale très fourchue.
– Dents caniniformes fortes sur les deux mâchoires et la voûte buccale.

Famille : STROMATEIDAE

Espèce : Stromateus fiatola (Linné, 1758).
Synonymes : – Stromateus fiasciatus (Risso, 1826).
– Stromateus microchirus (Cuvier et Val, 1833).

Nom F.A.O : Fiatole.
Noms locaux : Maltair (An).
Taille maximale : 50 cm ; Commune de 18 à 35 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants.
Régime alimentaire : Surtout petits poissons et de zoo-plancton, généralement de méduses.
Habitat : Comportement pélagique ou semi-pélagique ; espèce côtière surtout abondante dans les eaux turbides en été ; fréquent dans l'est, plus rare ailleurs.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D V-VI-38-45 ; A III-30-35.



Description :

– Corps ovale comprimé de couleur gris-bleuâtre, balayé par des lignes longitudinales brunâtres et dorées sur les flancs.
– Profil dorsal de la tête déprimé au dessus des yeux.
– Nageoires sombres, la caudale bordée de noir.
– Quatre à six rangées de dents pointues en carde à chaque mâchoire, celles de la rangée externe les plus grandes.

Famille : SYNODONTIDAE

Espèce : Synodus saurus (Linné, 1758).
Synonymes : – Saurus meleagrides Valenciennes, 1847.
– Laurida mediterranea Swainson, 1838.

Nom F.A.O : Lézard.
Noms locaux : Lézard (Al,BH,BS,An,K) ; Aharbabou (B) ; Zermmoumia (Gh).
Taille maximale : 35 cm.
Engins de capture : chaluts ; filets maillants.
Régime alimentaire : Surtout poissons et crevettes.
Habitat : Benthique surtout sur fonds vaseux, sablo-vaseux, graveleux ou d'herbiers du plateau continental dans les eaux assez chaudes.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D 11-13 ; A 9-11.



Description :

– Corps allongé, cylindrique avec une tête aplatie triangulaire.
– Coloration gris-brunâtre avec des taches brunes en forme de selle sur le dos.
– Une dorsale rejetée à l'arrière suivie d'une nageoire adipeuse située au-dessus de l'anale.
– Ligne latérale soulignée de jaune.
– Pelviennes allongées.

Famille : TRACHICHTHYIDAE

Espèce : Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829.
Synonymes : – Néant

Nom F.A.O : Hoplostète.
Noms locaux : Sa'a, Poisson montre (Al).
Taille maximale : 42 cm commune de 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond.
Régime alimentaire : Carnivore.
Habitat : Nectonique, au dessus des fonds du talus continental jusqu'à près de 1000 m ; parfois abondant.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D VI ; A III-8-11.



Description :

– Corps trapu et haut de couleur brun-argenté à reflets irisés et à l'aspect vitreux, ventre plus clair.
– Tête avec de grandes cavités muqueuses couvertes de peau épaisse.
– Fortes épines operculaires.
– Bouche oblique largement fendue.
– Forte carène ventrale.
– Dorsale à six épines fortes et espacées.
– Ligne latérale bien marquée.

Famille : TRACHINIDAE

Espèce : Echiichthys vipera (Cuvier, 1829).
Synonymes : – Trachinus vipera Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Petite vive.
Noms locaux : Araignée, Ellafaa (Al) ; Ragnia (BS,Gh) ; Araignée (BH,B,An,K).
Taille maximale : 15 cm ; commune de 8 à 12 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps-été.
Régime alimentaire : Petits poissons et petits invertébrés.
Habitat : Benthique, côtier, sur fonds meubles surtout sableux ; s'enfonce dans le sable.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 V-VII ; D2 21-24 ; A I-24-26.



Description :

– Corps élancé de couleur jaunâtre ou brunâtre avec de nombreux petits points sombres sur le dos.
– Forte épine operculaire venimeuse.
– Pas d'épine au dessus de l'œil.
– Première dorsale courte à épines vénimeuses et à membrane noire.
– Caudale bordée de noir.

Famille : TRACHINIDAE

Espèce *:* Trachinus araneus (Cuvier, 1829).
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O *:* Vive-araignée.
Noms locaux : Araignée, Ellafaa (Al) ; Ragnia (BS,Gh) ; Araignée (BH,B,An,K).
Taille maximale *:* 50 ; cm commune de 20 à 30 cm.
Engins de capture : Chaluts ; nasses ; filets maillants ; lignes.
Sexualité *:* Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps et en été.
Régime alimentaire *:* Petits poissons, crustacés.
Habitat *:* Benthique sur fonds côtiers sableux et sablo-vaseux ; s'enfonce dans le sable.
Distribution *:* O-C-E.
Formule radiaire *:* D1 V-VII ; D2 26-29 ; A II-29-31.



Description :

– Corps allongé et comprimé de couleur griâtre, assez sombre sur le dos et les flancs, avec des grosses taches noires sous la ligne latérale et des petites taches brunes au dessus.
– Bouche largement fendue.
– Forte épine operculaire vénimeuse.
– Deux épines au dessus de l'œil.
– Première dorsale courte à rayons durs et vénimeux.

Famille : TRACHINIDAE

Espèce : Trachinus draco Linné, 1758.
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O : Grande vive.
Noms locaux : Araignée, Ellafaa (Al) ; Ragnia (BS,Gh) ; Latraje (B) ; Araignée (BH,An,K).
Taille maximale : 45 ; cm commune de 10 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps-été.
Régime alimentaire : Petits invertébrés (surtout Crustacés et petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds sableux ou vaseux du plateau continental et plus rarement de la partie supérieure du talus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 V-VII ; D2 29-32 ; A II-27-34.



Description :

– Corps allongé et comprimé de couleur sable avec des lignes obliques sur les flancs soulignées de brun, jaune, vert et de bleu.
– Bouche oblique.
– Deux petites épines au dessus de l'œil et une au dessus de la lèvre supérieure en avant de l'œil.
– Forte épine vénimeuse sur l'opercule.
– Première dorsale à rayons durs et vénimeux et à membrane noire ; deuxième dorsale à rayons mous lavée de jaune.
– Anale mauve.

Famille : TRACHINIDAE

Espèce : Trachinus radiatus Cuvier, 1829.
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O : Vive à tête rayonné.
Noms locaux : Araignée, Ellafaa (Al) ; Ragnia (BS,Gh) ; Araignée (BH,B,An,K).
Taille maximale : 50 cm ; commune de 10 à 30 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps et été.
Régime alimentaire : Petits poissons et Crustacés.
Habitat : Benthique sur fonds de sable et de vase jusqu'à 150 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 V-VI ; D2 24-27 ; A I-26-29.



Description :

- Corps allongé et comprimé.
- Coloration brun-jaunâtre ornée de points sombres et des taches brunes plus ou moins annulaires sur les flancs.
- Grande bouche oblique.
- Forte épine operculaire vénimeuse.
- Deux ou trois épines au dessus de l'œil.
- Première dorsale courte à rayons épineux et vénimeux avec une tache noire sur la partie antérieure ; deuxième dorsale à rayons mous et tachetée de brun.
- Groupe de crêtes osseuses rayonnantes sur le dessus de la tête.

Famille : TRACHIPTERIDAE

Espèce : Zu cristatus (Bonelli, 1820).
Synonymes : – Trachypterus bonelli Valenciennes, 1835.

Nom F.A.O : Trachyptère ventru.
Noms locaux : Néant.
Taille maximale : 110 cm ; commune de 50 à 90 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts et palangres de fond.
Période de reproduction : Mai à août.
Régime alimentaire : Petits mollusques et Crustacés.
Habitat : Méso et bathypélagique des eaux tempérées chaudes ; capture occasionnelle.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps allongé, rubané très comprimé.
– Coloration argentée, marquée de taches sombres.
– Nageoires rouges ou jaunes.
– Premiers rayons de la dorsale longs, libres à leur extrémité.
– Ligne latérale marquée de plaques osseuses.
– Anale absente.
– Caudale séparée en deux lobes, le supérieur dirigé vers le haut, l'inférieur rudimentaire.

Famille : TRICHIURIDAE

Espèce : Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788).
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O : Sabre argenté.
Noms locaux : Néant.
Taille maximale : 210 cm ; commune de 50 à 150 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; palangres de fond.
Période de reproduction : Fin d'hiver-printemps.
Régime alimentaire : Poissons, crustacés et céphalopodes.
Habitat : Vit surtout sur la pente continentale et en bordure du plateau ; peut être très abondant dans les zones accidentées ; comportement semi-pélagique ; jeunes sur le plateau à partir de 40 - 50 m, adultes jusqu'à 600 m au moins.
Distribution : O-C-E.



Description :

– Corps très allongé, rubané et comprimé.
– Coloration gris-argenté, sombre sur la nuque et la partie antérieure de la dorsale.
– Fortes dents en crocs acérés à l'avant des mâchoires.
– Dorsale très longue.
– Ligne latérale à mi-hauteur du corps.
– Caudale petite, distincte de la dorsale et de l'anale.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Aspitrigla cuculus (Linné, 1758).
Synonymes : – Trigla cuculus Linné, 1758.
– Trigla grunniens Lacepède, 1801.

Nom F.A.O : Grondin rouge.
Noms locaux : Galinette (Al,BH,B,An,K) ; Grondin (BS) ; Borraco (Gh)
Taille maximale : 50 cm ; commune de 10 à 25 cm.
Engins de capture : chaluts de fond ; palangres ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Janvier à juillet.
Régime alimentaire : Petits crustacés, petits poissons et mollusques.
Habitat : Benthique sur fonds détritiques du plateau continental et plus rarement de la partie supérieure du talus jusque vers 400 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-X, D2 17-19 ; A 16-19.



Description :

– Corps élancé avec une tête cuirassée formée de plaques osseuses et présentant des épines et des crêtes.
– Œil bien développé.
– Museau terminé en rostre peu développé et peu échancré.
– Coloration rose assez vif, les pectorales plus ou moins lavées de violet.
– Bord antérieur du premier rayon dur denticulé.
– Pectorales atteignant l'aplomb de l'orifice anal avec les trois rayons inférieurs libres.
– Ecailles de la ligne latérale en plaques étroites très développées verticalement.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Aspitrigla obscura (Linné, 1764).
Synonymes : – Trigla obscura Linné, 1764.
– Trigla hyrax Pallas, 1811.

Nom F.A.O : Grondin morrude.
Noms locaux : Galinette (Al,BH,B,An,K) ; Grondin (BS) ; Borraco (Gh).
Taille maximale : 36 cm ; commune de 15 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; palangres ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Crustacés, surtout amphipodes, de petits poissons et mollusques.
Habitat : Benthique sur fonds mous, détritiques et herbiers du plateau continental.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IX-X , D2 16-18 ; A 16-18.



Description :

– Corps élancé avec une tête cuirassée armée d'épines et de crêtes.
– Museau terminé en rostre peu échancré avec trois petites épines.
– Coloration gris rosâtre ou brunâtre avec une bande claire sur les flancs.
– Deuxième rayon de la première dorsale plus allongé et se terminant en filament.
– Pectorales de couleur bleu-sombre dépassant l'origine de l'anale.
– Ecailles de la ligne latérale en plaques sans épines.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801).
Synonymes : – Trigla cavillone Lacepède, 1801.
– Trigla aspera Cuvier, 1829.

Nom F.A.O : Cavillone commun.
Noms locaux : Galinette (Al,BH,B,An,K) ; Grondin (BS) ; Borraco (Gh).
Taille maximale : 20 cm ; commun : 10 à 15 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps et été.
Régime alimentaire : Crustacés, (surtout mysidacés et amphipodes).
Habitat : Benthique sur fonds divers de sablo-vaseux à durs du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus (200 - 600 m) ; jeunes sur le plateau à partir de 25 - 30 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-X, D2 14-16 ; A 14-16.



Description :

– Corps allongé, avec une tête très épineuse et un museau abrupt terminé en rostre court, peu échancré à lobes bien denticulés.
– Coloration blanchâtre.
– Deux épines bien visibles au dessus de l'œil et un sillon transversal formant une dépression en arrière des yeux.
– Pectorales bleu-noirâtres atteignant ou dépassant le début de l'analé.
– Ecailles de la ligne latérale étroites et sans épines.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Lepidotrigla dieuzeidei Audouin nov.nom (Audouin MS 1973).

Synonymes : – . Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801).

Nom F.A.O : Grondin de Dieuzeide.

Noms locaux : Galinette (Al,BH,B,An,K) ; Grondin (BS) ; Borraco (Gh).

Taille maximale : 20 cm ; commun : 10 à 15 cm.

Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants.

Sexualité : Gonochorique.

Période de reproduction : Eté.

Régime alimentaire : Crustacés, (surtout amphipodes).

Habitat : Benthique sur fonds mous du plateau continental à partir de 70 - 80 m et du talus jusqu'à 600 m et plus.

Distribution : O-C-E.

Formule radiaire : D1 VIII-X, D2 14-15 ; A 14-16.



Description :

– Corps assez allongé, le museau abrupt terminé en rostre court peu échancré.
– Coloration rose-rouge, orangé.
– Bord antérieur de la première épine dorsale denticulé.
– Pectorales noirâtres, plus claires à leur base, longues et dépassant l'origine de l'anale.
– Ecailles de la ligne latérale plus hautes.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Trigla lucerna (Linné, 1758).
Synonymes : – Chelidonichtys lucerna (Linné, 1758).
– Trigla corax Bonaparte, 1834.

Nom F.A.O : Grondin perlon.
Noms locaux : Grondin, Galinette (Al,An) ; Galinette (BH, K) ; Borraco (Gh) ; Galinette, Manarma (BS).
Taille maximale : 75 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; palangres ; lignes ; filets maillants.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Décembre à avril.
Régime alimentaire : Crustacés, mollusques et petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds divers sableux, sablo-vaseux, graviers du plateau continental à partir de la côte jusqu'à son bord et la partie supérieure du talus.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-X, D2 14-18 ; A 14-17.



Description :

– Corps allongé à museau assez effilé se terminant en rostre à peine échancré.
– Coloration rose ou rouge-jaunâtre à violacée.
– Pectorales bien développées à l'aspect ailé, à face interne bleu-nuit tachetée de sombre et de blanc.
– Ecailles de la ligne latérale petites constituées de tubes simples.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Trigla lyra (Linné, 1758).
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O : Grondin lyre.
Noms locaux : Galinette, Grondin (BS,Or,Al,B,An) ; Galinette (BH, K) ; Borraco (Gh)).
Taille maximale : 60 cm ; commun : 15 à 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; palangres ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps et en été.
Régime alimentaire : Petits crustacés.
Habitat : Benthique sur fonds accidentés du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus jusque vers 600 - 700 m ; plus rare sur le plateau à partir de 50 m (jeunes).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 VIII-X, D2 16-17 ; A 16-19.



Description :

– Corps allongé à museau se terminant en rostre bien avancé et échancré à lobes dentelés.
– Fortes épines sur la tête, avec une épine operculaire bien développée atteignant la moitié de la pectorale.
– Coloration rouge orangé vif.
– Pectorales bien développées dépassant l'origine de l'anale.
– Ecailles de la ligne latérale à peine plus grandes que celles qui recouvrent le corps.

Famille : TRIGLIDAE

Espèce : Trigloporus lastoviza (Brünnich, 1768).
Synonymes : – Trigla lastovisa Brünnich, 1768.
– Trigla lineata Gmelin, 1789.

Nom F.A.O : Grondin camard.
Noms locaux : Galinette (Al,BH,B,An,K) ; Grondin (BS) ; Borraco (Gh)).
Taille maximale : 40 cm ; commun : 10 à 20 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; palangres.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps et été.
Régime alimentaire : Petits poissons.
Habitat : Benthique sur fonds vaseux ou sablo-vaseux du plateau continental jusqu'à la limite du talus (optimum 40 - 120 m).
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IX-XI, D2 15-17 ; A 14-16.



Description :

– Corps allongé marqué de plis dermiques transversaux obliques.
– Museau arrondi sans épines se terminant par un rostre à peine marqué.
– Coloration rouge orangé assez sombre avec quelques taches, museau rouge vif.
– Pectorales sombres tachetées de points bleutés, allongée et dépassant l'origine de l'anale.
– Ecailles de la ligne latérale carénées et armées de petites épines.

Famille : URANOSCOPIDAE

Espèce *:* Uranoscopus scaber (Linné, 1758).
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O *:* Uranascope.
Noms locaux : Rascasse blanche, Al Bouma, Madame François (Al,BH) ; Bouledogue, Toppa (BS) ; Bouledogue (BH,B,An, K).
Taille maximale *:* 35 cm .
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; filets maillants ; lignes.
Période de reproduction : Avril-août.
Régime alimentaire *:* Surtout poissons, également vers polychètes et Crustacés.
Habitat *:* Benthique sur fonds exclusivement vaseux et sablo-vaseux du plateau continental mais parfois près des roches.
Distribution *:* O-C-E.
Formule radiaire *:* D1 III-IV, D2 13-15 ; A I-12-14.



Description :

– Corps allongé, massif à l'avant, à forte tête aplatie dorsalement, armée d'épines et de crêtes.
– Coloration gris-beige tacheté de blanc ; ventre blanchâtre, partie antérieure du dos plus foncée.
– Yeux et narines sur le dessus de la tête.
– Bouche légèrement oblique, largement fendue avec un appendice mandibulaire noir, protractile et agité comme un leurre.
– Première dorsale courte, épineuse et noirâtre.
– Pectorales bien développées.

Famille : XIPHIIDAE

Espèce *:* Xiphias gladius Linné, 1758.
Synonymes : – Néant.

Nom F.A.O *:* Espadon.
Noms locaux : Espadon, Boucif-et-touil (Al) ; Space (BS,Or) ; Espadon (Gh) ; Spadon, Boussif (An) ; Spadon (BH,B,K).
Taille maximale *:* 450 cm ; commun : de 80 à de 220 cm.
Engins de capture : Sennes ; chaluts ; palangres pélagiques.
Sexualité *:* Gonochorique.
Période de reproduction : Juin-septembre.
Régime alimentaire *:* Carnivore, grande variété de poissons pélagiques et d'espèces démersales.
Habitat *:* Pélagique du large, mais peut se tenir près des côte surtout en été et près des régions insulaires.
Distribution *:* O-C-E.
Formule radiaire *:* D1 III-IV-15-16, D2 3-4; A 3-5.



Description :

– Corps allongé, cylindrique, massif à l'avant, le museau se terminant en rostre en forme d'épée longue et aplatie.
– Dos et flancs de couleur gris-noirâtre ; ventre brun ou gris clair.
– Deux dorsales, séparées chez les adultes, la première triangulaire.
– Pelviennes absentes.
– Forte carène latérale de chaque côté du pédoncule caudal.

Famille : ZEIDAE

Espèce : Zeus faber Linné, 1758.
Synonymes : – Zeus pungio Valenciennes, 1835.

Nom F.A.O : Saint-Pierre.
Noms locaux : Saint-Pierre, Hout Sidna Souleimane (Al) ; San Pedro (BS,Or,Gh) ; Saint-Pierre (BH,B,An,K).
Taille maximale : 65 cm ; commun : 40 cm.
Engins de capture : Chaluts de fond ; filets maillants ; lignes.
Sexualité : Gonochorique.
Période de reproduction : Printemps.
Régime alimentaire : Grande variété de poissons, parfois de Crustacés et de mollusques.
Habitat : Nectonique, vit à une certaine distance du fond ; fréquente surtout les fonds accidentés du bord du plateau continental et de la partie supérieure du talus jusque vers 400 m ; jeunes sur le plateau à partir de 30 - 40 m.
Distribution : O-C-E.
Formule radiaire : D1 IX-XI , 21-25, A IV, 20-24.



Description :

– Corps haut, très comprimé, aplati latéralement.
– Tête marquée de crêtes osseuses et d'épines , mâchoire supérieure massive et très protractile.
– Coloration vert grisâtre à reflets dorés plus clairs sur le ventre.
– Rayons épineux de la dorsale munis de filaments aussi longs que l'épine.
– Scutelles épineuses bien développées à la base de la dorsale et de l'anale.
– Profil ventral caréné.
– Tache sombre cerclée de clair sur les flancs.

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES.

A

acarne (Pagellus) 158
aeneus (Epinephelus) 130
agassizi (Chlorophthalmus) 55
alalunga (Thunnus) 119
alexandrinus (Epinephelus) 131
alleteratus (Euthynnus) 113
Alosa 57
amia (Lichia) 44
Anguilla 24
anguilla (Anguilla) 24
ANGUILLIDAE 24
annularis (Diplodus) 152
Anthias 25
anthias (Anthias) 25
ANTHIIDAE 25
aper (Capros) 39
araneus (Trachinus) 173
argenteus (Gadiculus) 69
Argentina 27
ARGENTINIDAE 27
Argyrosomus 106
Ariosoma 61
Arnoglossus 32,33,34
Aspitrigla 178,179
Atherina 28
ATHERINIDAE 28
atricauda (Serranus) 135
aurata (Liza) 94
aurata (Sparus) 165
auriga (Pagrus) 166
aurita (Sardinella) 59
Auxis 112
azevia (Microchirus) 142

B

balearicum (Ariosoma) 61
Balistes 29
BALISTIDAE 29
barbatum (Ophidion) 103
barbatus (Mullus) 96
Bathysolea 139
Belone 30
belone (Belone) 30
BELONIDAE 30
BLENNIIDAE 31
Blennius 31
blennoides (Phycis) 72
bogaraveo (Pagellus) 159
Boops 148
boops (Boops) 148
boscii (Lepidorhombus) 121
BOTHIDAE 32
Bothus 35
boyeri (Atherina) 28
Brama 36
brama (Brama) 36
BRAMIDAE 36
budegassa (Lophius) 83
Buglossidium 140

C

cabrilla (Serranus) 136
caeruleostictus (Pagrus) 161
Callanthias 26
CALLIONYMIDAE 37
Callionymus 37,38
canariensis (Umbrina) 108
caninus (Epinephelus) 132
cantharus (Spondyliosoma) 167
CAPROIDAE 39
Capros 39
CARANGIDAE 40
Campogramma 40
Caranx 41,42,43
carolinensis (Balistes) 29
cataphractum (Peristedion) 104

caudatus (Lepidopus) 177
cavillone (Lepidotrigla) 180
CENTRACANTHIDAE 51
Cepola 54
CEPOLIDAE 54
cervinus (Diplodus) 153
Chelon 93
CHLOROPHTHALMIDAE 55
Chlorophthalmus 55
cirrosa (Umbrina) 109
cirrus (Centracanthus) 51
CITHARIDAE 56
Citharus 56
CLUPEIDAE 57
Cœlorhynchus 86
cœlorhynchus (Cœlorhynchus) 86
Conger 62
conger (Conger) 62
CONGRIDAE 61
Coris 79
Coryphaena 63,64
CORYPHAENIDAE 63
cristatus (Zu) 176
crysos (Caranx) 41
cuculus (Aspitrigla) 178
cuneata (Dicologoglossa) 141
CYNOGLOSSIDAE 65

D

DACTYLOPTERIDAE 66
Dactylopterus 66
dactylopterus (Helicolenus) 125
Dalophis 100
Dentex 149,150,151
dentex (Dentex) 149
Dicentrarchus 91,92
Dicologoglossa 141
dieuzeidei (Lepidotrigla) 181
Diplodus 152,153,154,155
dypterygia (Molva) 71
draco (Trachinus) 174
ductor (Naucrates) 45
dumerili (Seriola) 46

E

Echelus 101
Echiichthys 172
elongata (Scorpaena) 126
encrasicolus (Engraulis) 67
ENGRAULIDAE 67
Engraulis 67
Epinephelus 130,131,132,133
equiselis (Coryphaena) 63
erythrinus (Pegellus) 160
Euthynnus 113
EXOCOETIDAE 86

F

faber (Zeus) 187
fallax (Alosa) 57
fiatola (Stromateus) 167

G

Gadiculus 69
GADIDAE 69
gibbosus (Dentex) 150
gladius (Xiphias) 186
glaycos (Campogramma) 40
GOBIIDAE 75
Gobius 75
guaza (Epinephelus) 133
Gymnothorax 98

H

HAEMULIDAE 76
helena (Muraena) 99
Helicolenus 125
hepatus (Serranus) 137
hippos (Caranx) 42
hippurus (Coryphaena) 64

Hirundichthys 68
Hoplostethus 171

I

imberbis (Dalophis) 100
imperialis (Arnoglossus) 32
incisus (Pomadasys) 78

J

japonicus (Scomber) 117
julis (Coris) 79

K

Katsuwonus 114
kleini (Solea) 144

L

labrax (Dicentrarchus) 91
LABRIDAE 79
labrosus (Chelon) 93
lascaris (Solea) 145
lastoviza (Trigloporus) 184
laterna (Arnoglossus) 33
Lepidopus 177
Lepidorhombus 121,122
Lepidotrigla 180,181
Lichia 44
linguatula (Citharus) 56
Lithognathus 156
Liza 94,95
LOPHIIDAE 83
Lophius 83,84
lucerna (Trigla) 182
luteum (Buglossidium) 140
lyra (Callionymus) 37
lyra (Trigla) 183

M

macrophthalma (Cepola) 54
MACRORAMPHOSIDAE 85
Macroramphosus 85
MACROURIDAE 86
maderensis (Sardinella) 60
maena (Spicara) 52
maroccanus (Dentex) 151
maxima (Psetta) 123
mediterraneus (Hoplostethus) 171
mediterraneus (Plectorhinchus) 77
mediterraneus (Trachurus) 48
melanura (Oblada) 157
melops (Symphodus) 80
MERLUCCIIDAE 89
Merluccius 89
merluccius (Merluccius) 89
Microchirus 142,143
Micromesistius 70
minutus capelanus (Trisopterus) 74
Mola 90
mola (Mola) 90
MOLIDAE 90
Molva 71
mormyrus (Lithognathus) 156
MORONIDAE 91
MUGILIDAE 93
MULLIDAE 96
Mullus 96,97
Muraena 99
MURAENIDAE 98
myrus (Echelus) 101

N

nasuta (Solea) 146
Naucrates 45
Nezumia 87
niger (Gobius) 75
nigrescens (Symphurus) 65
notata (Scorpaena) 127
novacula (Xyrichthys) 82

O

Oblada 157

obscura (Aspitrigla) 179
ocellaris (Blennius) 31
octolineatum (Parapristipoma) 76
OPHICHTHIDAE 100
OPHIDIIDAE 103
Ophidion 103
Ophisurus 102
Orcynopsis 115
ovatus (Trachinotus) 47

P

Pagellus 160
Pagrus 161,162
pagrus (Pagrus pagrus) 162
Parapristipoma 76
pavo (Thalassoma) 81
pelamis (Katsuwonus) 114
PERISTEDIIDAE 104
Peristedion 104
phaeton (Callionymus) 38
Phycis 72,73
phycis (Phycis) 73
picturatus (Trachurus) 49
pilchardus (Sardina) 58
piscatorius (Lophius) 84
Plectorhinchus 77
podas (Bothus) 35
Pomadasys 78
POMATOMIDAE 105
Pomatomus 105
porcus (Scorpaena) 128
poutassou (Micromesistius) 70
profundicola (Bathysolea) 139
Psetta 123
punctatus (Dicentrarchus) 92
Puntazzo 163
puntazzo (Puntazzo) 163

R

radiatus (Trachinus) 175
regius (Argyrasomus) 106
rhombus (Scophthalmus) 124
rhonchus (Caranx) 43
ronchus (Umbrina) 110
rochei (Auxis) 112
rondeletii (Hirundichthys) 68
ruber (Callanthias) 26

S

saliens (Liza) 95
salpa (Sarpa) 164
saltatrix (Pomatomus) 105
Sarda 116
sarda (Sarda) 116
Sardina 58
Sardinella 59,60
sargus (Diplodus) 154
Sarpa 164
saurus (Scomberesox) 111
saurus (Synodus) 170
scaber (Uranoscopus) 185
Sciaena 107
SCIAENIDAE 106
sclerorhynchus (Nezumia) 87
scolopax (Macroramphosus) 85
Scomber 117,118
SCOMBERESOCIDAE 111
Scomberesox 111
SCOMBRIDAE 112
scombrus (Scomber) 118
SCOPHTHALMIDAE 121
Scophthalmus 124
Scorpaena 126,127,128,129
SCORPAENIDAE 125
scriba (Serranus) 138
scrofa (Scorpaena) 129
serpens (Ophisurus) 102
SERRANIDAE 130
Serranus 135,136,137,138
smaris (Spicara) 53
Solea 144,145,146,147
SOLEIDAE 139

SPARIDAE 148
Sparus 148
Sphyraena 168
sphyraena (Argentina) 27
sphyraena (Sphyraena) 168
SPHYRAENIDAE 168
Spicara 52,53
Spondyliosoma 167
STROMATEIDAE 169
Stromateus 169
surmuletus (Mullus) 97
Symphodus 80
Symphurus 69
SYNODONTIDAE 170
Synodus 170

T

Thalassoma 81
thori (Arnoglossus) 34
Thunnus 119,120
thynnus thynnus (Thunnus) 120
TRACHICHTHYIDAE 171
TRACHINIDAE 172
Trachinotus 47
Trachinus 173,174,175
TRACHIPTERIDAE 176
Trachurus 48,49,50
trachurus (Trachurus) 50
TRICHIURIDAE 177
Trigla 182,183
TRIGLIDAE 178
Trigloporus 184
Trisopterus 74

U

umbra (Sciaena) 107
Umbrina 108,109,110
unicolor (Gymnothrax) 98
unicolor (Orcynopsis) 115
URANOSCOPIDAE 185
Uranoscopus 185

V

variegatus (Microchirus) 143
vipera (Echiichthys) 172
volitans (Dactylopterus) 66
vulgaris (Diplodus) 155
vulgaris (Solea) 147

W

Whiffiagonis (Lepidorhombus) 122

X

Xiphias 186
XIPHIIDAE 186
Xyrichthys 82

Z

ZEIDAE 187
Zeus 187
Zu 176

INDEX DES FAMILLES ET DES ESPECES

FAMILLE	ESPECE	PAGE
ANGUILLIDAE	Anguilla anguilla	24
ANTHIIDAE	Anthias anthias	25
	Callanthias ruber	26
ARGENTINIDAE	Argentina sphyraena	27
ATHERINIDAE	Atherina boyeri	28
BALISTIDAE	Balistes carolinensis	29
BELONIDAE	Belone belone	30
BLENNIIDAE	Blennius ocellaris	31
BOTHIDAE	Arnoglossus imperialis	32
	Arnoglossus laterna	33
	Arnoglossus thori	34
	Bothus podas	35
BRAMIDAE	Brama brama	36
CALLIONYMIDAE	Callionymus lyra	37
	Callionymus phaeton	38
CAPROIDAE	Capros aper	39
CARANGIDAE	Campogramma glaycos	40
	Caranx crysos	41
	Caranx hippos	42
	Caranx rhonchus	43
	Lichia amia	44
	Naucrates ductor	45
	Seriola dumerili	46
	Trachinotus ovatus	47
	Trachurus mediterraneus	48
	Trachurus picturatus	49
	Trachurus trachurus	50
CENTRACANTHIDAE	Centracanthus cirrus	51
	Spicara maena	52
	Spicara smaris	53
CEPOLIDAE	Cepola macrophthalma	54
CHLOROPHTHALMIDAE	Chlorophthalmus agassizi	55
CITHARIDAE	Citharus linguatula	56
CLUPEIDAE	Alosa fallax	57
	Sardina pilchardus	58
	Sardinella aurita	59
	Sardinella maderensis	60
CONGRIDAE	Ariosoma balearicum	61
	Conger conger	62
CORYPHAENIDAE	Coryphaena equiselis	63
	Coryphaena hippurus	64
CYNOGLOSSIDAE	Symphurus nigrescens	65
DACTYLOPTERIDAE	Dactylopterus volitans	66

ENGRAULIDAE	*Engraulis encrasicolus*	67
EXOCOETIDAE	*Hirundichthys rondelitii*	68
GADIDAE	*Gadiculus argenteus argenteus*	69
	Micromesistius poutassou	70
	Molva dipterygia macrophthalma	71
	Phycis blennoides	72
	Phycis phycis	73
	Trispoterus minutus capelanus	74
GOBIIDAE	*Gobius niger jozo*	75
HAEMULIDAE	*Parapristipoma octolineatum*	76
	Plectorhinchus mediterraneus	77
	Pomadasys incisus	78
LABRIDAE	*Coris julis*	79
	Symphodus melops	80
	Thalassoma pavo	81
	Xyrichthys novacula	82
LOPHIIDAE	*Lophius budegassa*	83
	Lophius piscatorius	84
MACRORAMPHOSIDAE	*Macropamphosus scolopax*	85
MACROURIDAE	*Coelorhynchus coelorhynchus*	86
	Nezumia sclerorhynchus	87
	Trachyrhynchus trachyrhynchus	88
MERLUCCIIDAE	*Merluccius merluccius*	89
MOLIDAE	*Mola mola*	90
MORONIDAE	*Dicentrarchus labrax*	91
	Dicentrarchus punctatus	92
MUGILIDAE	*Chelon labrosus*	93
	Liza aurata	94
	Liza saliens	95
MULLIDAE	*Mullus barbatus*	96
	Mullus surmuletus	97
MURAENIDAE	*Gymnothorax unicolor*	98
	Muraena helena	99
OPHICHTHIDAE	*Dalophis imberbis*	100
	Echelus myrus	101
	Ophisurus serpens	102
OPHIDIIDAE	*Ophidion barbatum*	103
PERISTEDIIDAE	*Peristedion cataphractum*	104
POMATOMIDAE	*Pomatomus saltatrix*	105
SCIAENIDAE	*Argyrosomus regius*	106
	Sciaena umbra	107
	Umbrina canariensis	108
	Umbrina cirrosa	109
	Umbrina ronchus	110
SCOMBERESOCIDAE	*Scomberesox saurus*	111

SCOMBERESOCIDAE	*Scomberesox saurus*	*111*
SCOMBRIDAE	*Auxis rochei*	*112*
	Euthynnus alleteratus	*113*
	Katsuwonus pelamis	*114*
	Orcynopsis unicolor	*115*
	Sarda sarda	*116*
	Scomber japonicus	*117*
	Scomber scombrus	*118*
	Thunnus alalunga	*119*
	Thunnus thynnus thynnus	*120*
SCOPHTHALMIDAE	*Lepidorhombus boscii*	*121*
	Lepidorhombus whiffiagonis	*122*
	Psetta maxima	*123*
	Scophthalmus rhombus	*124*
SCORPAENIDAE	*Helicolenus dactylopterus*	*125*
	Scorpaena elongata	*126*
	Scorpaena notata	*127*
	Scorpaena porcus	*128*
	Scorpaena scrofa	*129*
SERRANIDAE	*Epinephelus aeneus*	*130*
	Epinephelus alexandrinus	*131*
	Epinephelus caninus	*132*
	Epinephelus guaza	*133*
	Polyprion americanus	*134*
	Serranus atricauda	*135*
	Serranus cabrilla	*136*
	Serranus hepatus	*137*
	Serranus scriba	*138*
SOLEIDAE	*Bathysolea profundicola*	*139*
	Buglossidium luteum	*140*
	Dicologoglossa cuneata	*141*
	Microchirus azevia	*142*
	Microchirus variegatus	*143*
	Solea kleini	*144*
	Solea lascaris	*145*
	Solea nasuta	*146*
	Solea vulgaris	*147*
SPARIDAE	*Boops boops*	*148*
	Dentex dentex	*149*
	Dentex gibbosus	*150*
	Dentex maroccanus	*151*
	Diplodus annularis	*152*
	Diplodus cervinus	*153*
	Diplodus sargus	*154*
	Diplodus vulgaris	*155*
	Lithognathus mormyrus	*156*
	Oblada melanura	*157*
	Pagellus acarne	*158*
	Pagellus bogaraveo	*159*
	Pagellus erythrinus	*160*

	Pagrus caeruleostictus	*161*
	Pagrus pagrus pagrus	*162*
	Puntazzo puntazzo	*163*
	Sarpa salpa	*164*
	Sparus aurata	*165*
	Sparus auriga	*166*
	Spondyliosoma cantharus	*167*
SPHYRAENIDAE	*Sphyrena sphyrena*	*168*
STROMATEIDAE	*Stromateus fiatola*	*169*
SYNODONTIDAE	*Synodus saurus*	*170*
TRACHICHTHYIDAE	*Hoplostethus mediterraneus*	*171*
TRACHINIDAE	*Echiichthys vipera*	*172*
	Trachinus araneus	*173*
	Trachinus draco	*174*
	Trachinus radiatus	*175*
TRACHIPTERIDAE	*Zu cristatus*	*176*
TRICHIURIDAE	*Lepidopus caudatus*	*177*
TRIGLIDAE	*Aspitrigla cuculus*	*178*
	Aspitrigla obscura	*179*
	Lepidotrigla cavillone	*180*
	Lepidotrigla dieuzeidei	*181*
	Trigla lucerna	*182*
	Trigla lyra	*183*
	Trigloporus lastoviza	*184*
URANOSCOPIDAE	*Uranoscopus scaber*	*185*
XIPHIIDAE	*Xiphias gladius*	*186*
ZEIDAE	*Zeus faber*	*187*

INDEX DES NOMS F.A.O.

	PAGE
A	
Allache	*59*
Alose feinte	*57*
Anchois commun	*67*
Anguille	*24*
Argentine	*27*
Arnoglosse impérial	*32*
Arnoglosse de Thor	*34*
B	
Balaou	*111*
Baliste-cabri	*29*
Barbier-perroquet	*26*
Bar européen	*91*
Bar tacheté	*92*
Barbue	*124*
Baudroie commune	*84*
Baudroie rousse	*83*
Bécasse de mer	*85*
Bécune européenne	*168*
Blennie-papillon	*31*
Bogue	*148*
Bonite à dos rayé	*116*
Bonite à ventre rayé	*114*
Bonitou-auxide	*112*
C	
Capelan	*74*
Carangue coubali	*41*
Carangue crevelle	*42*
Cardine franche	*122*
Cardine à quatre taches	*121*
Castagnole	*25*
Cavillone commun	*180*
Cépole commune	*54*
Cernier commun	*134*
Céteau	*141*
Chinchard à queue jaune	*48*
Chinchard d'Europe	*50*
Chinchard du large	*49*
Comète coussut	*43*
Congre des Baléares	*61*
Congre d'Europe	*62*
Corb commun	*107*
Coryphène commune	*64*
Coryphène dauphin	*63*
Crénilabre mélops	*80*
D	
Denté commun	*149*
Denté du Maroc	*151*
Diagramme gris	*77*
Donzelle	*103*
Dorade grise	*167*
Dorade rose	*159*
Dorade royale	*165*
Dragonnet-lyre	*37*
Dragonnet	*38*
E	
Eperlan du large	*55*
Espadon	*186*
Exocet-ailes noires	*68*
F	
Fausse-limande	*33*
Feuille	*56*
Fiatole	*169*
G	
Germon	*119*
Girelle	*79*
Girelle paon	*81*
Gobie noir	*75*
Grande allache	*60*
Grande castagnole	*36*
Grande vive	*174*
Grenadier	*84,86,88*
Grondeur métis	*78*
Grondeur rayé	*76*
Grondin camard	*184*
Grondin de Dieuzeide	*181*
Grondin gris	*182*

	PAGE
Grondin morrude	179
Grondin rouge	178
Grondin volant	66
Grondin-lyre	183
Grondin-perlon	182
Gros denté rose	150
H	
Hoplostète	171
J	
Joel	28
L	
Lézard	170
Liche né-bé	44
Liche lirio	40
Lingue bleue	71
M	
Maigre commun	106
Malarmat	104
Maquereau commun	118
Maquereau espagnol	117
Marbré	156
Mendole	52
Merlan argenté	69
Merlan bleu	70
Merlu commun	89
Mérou badèche	131
Mérou blanc	130
Mérou gris	132
Mérou noir	133
Mulet doré	94
Mulet lippu	93
Mulet sauteur	95
Murène brune	98
Murène de la Méditerranée	99
O	
Oblade	157
Ombrine bronzée	108
Ombrine côtière	109
Ombrine fusca	110
Orphie	30
P	
Pageot acarné	158
Pageot commun	160
Pagre commun	162
Pagre à points bleus	161
Pagre rayé	166
Palomètte	115
Palomine	47
Petite rascasse	127
Petite sole jaune	140
Petite vive	172
Phycis de fond	72
Phycis de roche	73
Picarel	53
Picarel guetteur	51
Plagusie sombre	65
Poisson-lune	90
Poisson-pilote	45
R	
Rascasse brune	128
Rascasse de fond	125
Rascasse rose	126
Rascasse rouge	129
Razon	82
Rombou	35
Rouget barbet de roche	97
Rouget barbet de vase	96
S	
Sabre argenté	177
Saint-Pierre	187
Sanglier	39
Sar à grosses lèvres	153
Sar à museau pointu	163
Sar à tête noire	155
Sar commun	154
Sardine	58
Saupe	164
Seriole couronnée	46
Serpenton	100
Serpenton à nez long	102
Serpenton miro	101
Serran à queue noire	135
Serran-chèvre	136
Serran-écriture	138
Serran-tambour	137

	PAGE
Sole commune	*147*
Sole des profondeurs	*139*
Sole de mer Egée	*146*
Sole de pole	*145*
Sole tachetée	*144*
Sole-perdrix commune	*143*
Sole-perdrix juive	*142*
Sparaillon commun	*152*
T	
Tassergal	*105*
Thon rouge	*120*
Thonine	*113*
Trachyptère ventru	*176*
Turbot	*123*
U	
Uranoscope	*185*
V	
Vive à tête rayée	*175*
Vive-araignée	*173*

INDEX DES NOMS LOCAUX

	PAGE
A	
Abadèche	*131*
Aharbabou	*170*
Aiguille	*30,111*
Albadhar	*162*
Albaguore	*113*
Albasla	*54*
Albouma	*185*
Alfaham	*167*
Alghrâb	*107*
Alkhantchour	*154*
Almarra	*133,134*
Alose	*57*
Alrsela	*116*
Anchois	*67*
Anguille	*24*
Antchouba	*67*
Antchova	*67*
Araignée	*172,173,174,175*
Argentin	*27, 55*
Argentine	*27*
Aroussa	*79*
Asqqoum	*156*
Asserra	*105*
Athérine	*28*
B	
Baccalao	*70*
Bacoréta	*117*
Bacorète	*113*
Badécha	*131*
Badèche	*131*
Bagla	*109*
Barbue	*124*
Barracuda	*168*
Baudroie	*79,80*
Bayajo	*131*
Becofino	*163*
Belkhenzize	*31*
Betsol	*151*
Betsoune	*151*
Bezougue	*158*
Bidrilla	*155*
Bizigo	*158*
Bocorone	*67*
Bogga el hamra	*51*
Bonite	*114,116*
Bonite mère	*114*
Bonite plate	*114*
Bonito	*116*
Bonitou	*112*
Broche	*168*
Brochet	*168*
Borraco	*178,179, 180, 181, 182, 183, 184*
Bossu	*150*
Boucif ettouil	*186*
Bougga	*148*
Bouir	*59*
Bouledogue	*185*
Boumechita	*158*
Boumekhiat.	*30*
Bouricha	*150*
Bourri	*93, 94, 95*
Bourri mdahab	*94*
Bourri doré	*94*
Bourrourou	*123*
Bousnane	*150,154*
Boussefra	*94*
Boussif	*186*
C	
Cabaya	*118*
Cabote	*75*
Caramel	*51*
Castagnole	*36*
Castagnole rouge	*137*
Cavalla	*112*
Cavaya	*117, 118*
Chadi	*31, 75*
Chama	*150*
Charbonnier	*167*
Cernier	*134*
Chelba	*164*
Cherna	*134*
Chernice	*134*
Chèvre	*47*
Chfech	*109*
Cigarette	*51*
Chitane del bhar	*83,84*

	PAGE
Chpigarel	*158*
Cochon	*29*
Cochon de mer	*29*
Cocotte	*151*
Colonel	*28,104*
Congre	*61,62*
Congri	*62*
Congro	*62*
Coq	*25,26*
Corb	*107*
Corbeau	*123*
Corbino	*107*
Coryphène	*63,64*
Cra-cra	*77,78*
Crapa	*83,84*
Crapaud	*83-84*
D	
Demoiselle	*79,81*
Dendu	*150*
Denge	*149*
Dentch	*149*
Denti	*149,150*
Diable	*37*
Diablotin	*38*
Dobla	*157*
Doblade	*157*
Dora	*165*
Dorade	*165*
E	
Elbejjij	*160*
Elkahla	*157*
Ellaffaa	*172,173,175*
Elsène	*141*
Embouguade	*44*
Epingle	*82*
Escorbai	*106*
Espadon	*186*
Etoile	*47*
F	
Far	*86,87,88*
Fausse limande	*121,122*
Fausse mustelle	*71*
Faux merlan	*70,74*
Ferkh el bhar	*66*
Fiancé	*161*
Figue	*106*
Figue machk	*70*
G	
Gabolé	*75*
Galinette	*178,179,180, 181,182,183,184*
Girelle	*79*
Gobie	*75*
Gobye	*75*
Gonfar	*91*
Gonfran	*92*
Goujon	*31*
Grengue	*62*
Grondin	*66,178,179,180, 181,182,183,184*
Grondin gaméo	*104*
Gros-yeux	*159*
H	
Haddad	*107*
Hallouf	*29*
Hallouf el bhar	*29*
Hebo	*35,123*
Hirondelle	*66*
Hmam el bhar	*125*
Hnech	*24,61,62, 100,101,102*
Hout Sidna Souleimane	*187*
I	
Iless	*141*
J	
Japonais	*50*
Jaret	*51*
K	
Kaballa	*117,118*
Kahla	*157*
Kahli	*156,157*
Kaross	*91*
Karous	*52,53,91,92*
Kaval	*117,118*

	PAGE
Khouril	*50*
Khouttaifa	*66,68*
L	
La'alaz	*168*
La'aoun	*28*
Lalose	*57*
Lambernous	*106*
Lampougue	*63,64*
Lanchoi	*67*
Langueta	*141*
Languette	*141*
Laraq	*85*
Latcha	*59,60*
Latchoum	*59*
Latraje	*174*
Lézard	*170*
Licha	*44*
Liche	*44*
Lichola	*44,46*
Lilza	*93,95*
Limande	*56*
Limon	*46*
Linguao	*142*
Lintchola	*46*
Liobarro	*91,92*
Lirjous	*89*
Lotte	*83,84*
Loup	*91,92,93*
Loup moucheté	*92*
M	
Ma'aza	*125*
Madame François	*185*
Mafroune	*158,159*
Makala	*72,73*
Malarma	*104*
Malarmow	*104*
Maltair	*169*
Manarma	*182*
Manfroum	*159*
Maquereau	*117,118*
Marbré	*156*
Mechta	*82*
Melva	*112*
Menchouba	*67*
Menkous	*156*
Merdjane	*159*
Merlan	*70,89*
Mernouze	*70,89*
Mérot	*133,134*
Mérot blanc	*132*
Mérou	*130,132,133,134*
Mérou blanc	*132*
Mérou brun	*133*
Mérou jaune	*133*
Mérou voleur	*130*
Mlal elhadjra	*97*
Mlal el khaz	*96*
Mola	*90*
Mostela	*72,73*
Moustelle	*72,73*
Mrina	*98,99*
Mulet	*93,94,95*
Murène	*99*
Murrena	*99*
Mystelle	*72,73*
N	
Naquâb	*109*
O	
Ombrine	*106,107,108,109,110*
Ombrine de sable	*109*
Ousbit	*56*
P	
Pacalow	*70*
Pageot	*159,160*
Pagre	*166,162*
Pagre bossu	*150*
Pagre rayé	*166*
Pagri	*162*
Palaya	*147*
Palomètte	*115*
Palomina	*47*
Paromila	*47*
Patchano	*159*
Pech-limon	*46*
Pech-trompette	*39,85*
Peloua	*56*
Pilova	*147*
Pinioua	*56*
Poisson lune	*90*
Poisson maltais	*63,64*

	PAGE
Poisson montre	*171*
Poisson pilote	*45*
Poisson serre	*105*
Poisson soleil	*90*
Poisson trompette	*39,85*
Poisson volant	*66*
Pompier	*150*
Pray	*162,166*
Q	
Quadjoudj	*165*
Quârous	*106*
R	
Racaou	*80,81*
Ragnia	*172,173,174,175*
Rania	*172,173,174,175*
Rapé	*83,84*
Rapi	*83,84*
Rascassa	*125,127,128,129*
Rascasse	*125,126,127,128,129*
Rascasse blanche	*185*
Rasoir	*82*
Rason	*82*
Raspaillon	*152*
Rat	*63,64*
Razoul	*82*
Reqiqa	*140*
Rocca	*97*
Ronfleur	*76,77,78*
Rouget	*96,97*
Rougi	*96,97*
Rumbo	*35*
S	
Sa'a	*171*
Sainte-Marie	*116*
Saint-Pierre	*187*
Salaga	*57,60*
Salmonètè	*96*
Salpa	*164*
Sanglier	*39*
San-Pedro	*187*
Saorel	*49*
Saorel elzrag	*48*
Saorel impérial	*48*
Saourel	*50*
Saourel impérial	*48*
Saouril	*50*
Saourine	*48,49,50*
Sar	*152,153,154,155,163*
Sargo	*152,153,154,155*
Sarakin	*60*
Saraquel	*57*
Sarran	*135,136,137,138*
Sarrano	*135,136,137,138*
Sarran zalamite	*135,136,137,138*
Saupe	*164*
Saurel	*43,50*
Sbet	*54*
Schpigue	*52,53*
Scorbai	*107*
Scorpa	*126*
Sebta	*30*
Selbah	*24,62*
Selbah elbhar	*62*
Serdine	*58*
Serdouk	*25,26,137*
Serdouk elahmar	*104*
Serpent de mer	*100,101,102*
Serra	*105*
Serranow	*135,136,137,138*
Shaghre	*163*
Sidi-Moussa	*124*
Sinta	*54*
Sirène	*168*
Sola	*140,145,147*
Sole	*35,65,139,140,141,142, 143,144,145,146,147*
Soltana	*68*
Souris	*63,64*
Space	*186*
Spadon	*186*
Sparaillon	*152*
Sparle	*152,154,155*
Spetone	*30*
Stoum	*112*
Stroum	*112*
T	
Tachaco	*39*
Tambour	*153,154*
Tamoude	*167*
Tanout	*167*
Tapacoul	*32,33,34*
Tasselbahth	*24*
Tchelba	*164*

	PAGE
Tchelbine	*164*
Tcherel	*48,49,50*
Tchoukla	*52,53*
Tchucla	*52,53*
Than	*120*
Thon	*119,120*
Thone	*120*
Thonine	*113*
Thopa	*167*
Tifireless	*66*
Tiflilis	*68*
Toba	*86,87*
Tonino	*48*
Toppa	*185*
Torino	*48*
Trompette de mer	*85*
Turbot	*35,123,124*
V	
Vopa	*148*
Vope	*148*
Y	
Yeux-verts	*55*
Z	
Zermoumia	*170*

CORRESPONDANCES NOMS F.A.O. - NOMS LOCAUX

A

Allache	*Bouir, Latcha, Latchoum.*
Alose feinte	*Alose, Lalose, Salaga, Saraquel.*
Anchois commun	*Anchois, Anchouva, Antchouba, Bocorone, Lanchoi, Menchouba.*
Anguille	*Anguille, Hnech, Selbah.*
Argentine	*Argentine.*
Arnoglosse impérial	*Tapacoul.*
Arnoglosse de Thor	*Tapacoul.*

B

Balaou	*Aiguille.*
Baliste-cabri	*Cochon de mer, Halouf, Halouf el bhar.*
Barbier-hirondelle	*Coq, Serdouk.*
Barbier-perroquet	*Coq, Serdouk.*
Bar européen	*Gonfran, Kârous, liobarro, Loup.*
Bar tacheté	*Gonfran, Kârous, Liobarro, Loup.*
Barbue	*Barbue, Sidi-Moussa, Turbot.*
Baudroie commune	*Baudroie, Chitane delbhar, Crapaud, Lotte, Rapé, Crapa.*
Baudroie rousse	*Baudroie, Chitane delbhar, Crapaud, Lotte, Rapé, Crapa.*
Bécasse de mer	*Laraq, Pech-trompette, Trompette, Poisson-trompette.*
Bécune européenne	*Barracuda, Broche, Brochet, Laalaz, Sirèn.*
Blennie-papillon	*Belkhanzize, Goujon.*
Bogue	*Bougga, Vopa, Vope.*
Bonite à dos rayé	*Alrsela, Bonite, Bonito, Sainte-Marie.*
Bonite à vente rayé	*Bonite, Bonite mère, Bonite plate.*
Bonitou-auxide	*Bonitou, Cavalla, Melva, Stroum.*

C

Capelan	*Faux-merlan.*
Cardine franche	*Fausse limande.*
Cardine à quatre taches	*Fausse limande.*
Cavillon commun	*Barraco, Galinette, Grondin.*
Cépole commune	*Albasla, Sbet, Sinta.*
Cernier commun	*Al-marran, Cernier, Cherna, Chernice, Merot, Mérou.*
Céteau	*Elsène, Iless, Languita, Languette, Sole.*
Chinchard à queue jaune	*Saorel impérial, Saourine, Tcherel, Tonino, Saurel elzrag.*
Chinchard d'Europe	*Khouril, Saouril, Saourine, Saurel, Sauril, Tcherel, Japonais (jeune).*
Chinchard du large	*Saorel, Saourine, Tcherel.*
Congre	*Congre, Hnech.*
Congre d'Europe	*Congre, Congri, Congro, Grengue, Selbah el bhar.*
Corb commun	*Al ghrab, Corb, Corbino, Haddad, Scorbai, Ombrine.*
Coryphène commune	*Coryphène, Lampougue, Poisson-maltais.*
Coryphène dauphin	*Coryphène, Lampougue, Poisson-maltais.*
Crénilabre mélops	*Racaou*

D

Denté commun	*Dengue, Denti, Dentch, Dintch*
Denté du Maroc	*Bentsoune, Cocotte*
Diagramme gris	*Ronfleur, Cra-cra.*
Dorade grise	*Al-Fahham, Charbonnier, El Kahla, Tamoude, Tanout, Thopa.*
Dorade rose	*Gros-yeux, Manfroune, Merdjane, Pageot, Patchano.*
Dorade royale	*Benzerti, Dora, Dorade, Quadjoudj.*
Dragonnet-lyre	*Diable.*

E

Eperlan du large	*Argentin, Yeux-verts.*

Espadon	*Boucif, Boucif ettouil, Espadon, Space, Spadon.*
Exocet-ailes noires	*khattaifa, khottaiffa, Soltana, Tiflilis.*

F

Fausse-limande	*Tapacoul.*
Feuille	*Limande, Ousbit, Peloua, Pinoua.*
Fiatole	*Maltair.*

G

Germon	*Thon.*
Girelle	*Demoiselle, Arroussa.*
Girelle paon	*Demoiselle, Racaou.*
Gobie noir	*Gobye*
Girelle paon	*Cabote, Chadi, Gabolé, Gobie,*
Grande allache	*Latcha, Salaga, Sarakin.*
Grande castagnole	*Castagnole.*
Grande vive	*Allafaa, Araignée, Latraje, Ragnia.*
Grenadier	*Far, Toba.*
Grondeur métis	*Ronfleur.*
Grondeur rayé	*Ronfleur.*
Grondin camard	*Borraco, Galinette, Grondin.*
Grondin de Dieuzeide	*Borraco, Galinette, Grondin.*
Grondin gris	*Borraco, Galinette, Grondin.*
Grondin morrudes	*Barraco, Galinette, Grondin.*
Grondin rouge	*Hirondelle, Khouttaifa, Tifireless, Grondin.*
Grondin volant	*Poisson-volant, Ferkh elbhar, Khattaifa.*
Grondin-lyre	*Barraco, Galinette, Grondin.*
Grondin-perlon	*Borraco, Galinette, Grondin, Manarma.*
Gros denté rose	*Bousnane, Bossu, Chama, Denti, Dendu, Pagre bossu, Pompier, Bouricha (jeune).*

H

Hoplostète	*Poisson-montre, Sa'a.*

J

Joel	*Atherine, Laaoun.*

L

Liche né-bé	*Licha, Liche, Litch, Embouguade (jeune).*
Lingue bleue	*Fausse mustelle.*

M

Maigre commun	*Escorbai, Figue, Ombrine, Quârous.*
Malarmat	*Colonnel, Grondin gaméon, Malarma, Malarmow, Serdouk lahmar.*
Maquereau commun	*Cabaya, Cavaya, Kabala, Kaval, Maquereau.*
Maquereau espagnol	*Bacoréta, Kabala, Kaval, Maquereau.*
Marbré	*Asqqoum, kahli, Marbré, Menkous.*
Mendole	*Kârous, Schpigue, Tchoukla, Tchucla.*
Merlan bleu	*Baccalao, Figue-machk, Merlan, Merlu, Mernouze, Faux merlan, Pacalow.*
Merlu commun	*Lirdjous, Merlan, Merlu, Mernouze.*
Mérou badèche	*Abadèche, Badéch, Badèche, Bayajo.*
Mérou blanc	*Mérou, Mérou voleur.*
Mérou gris	*Mérot blanc, Mérou.*
Mérou noir	*Almarra, Mérot, Mérou, Mérou brun, Mérou jaune.*
Mérou royal	*Mérou.*
Mulet à grosse tête	*Bourri, Lilsa, Mulet.*
Mulet doré	*Bourri, Bourri-mdahab, Mulet.*
Mulet lippu	*Bourri, Mulet.*
Muler sauteur	*Bourri, Mulet.*
Mulet-porc	*Bourri, Linza, Gabisolé, Mulet.*
Murène de la Méditerranée	*Karous, Mrina, Murène, Murrena.*

O

Oblade	*Doblade, Dobla, Elkahla, Kahla, Kahli.*
Ombrine bronzé	*Ombrine.*
Ombrine côtière	*Bagla, Chfech, Naquâb, Ombrine.*
Ombrine fusca	*Ombrine.*
Orphie	*Aiguille, Boumekhiat, Sebta, Spetone.*
Pageot acarné	*Bezougue, Bezougo, Bizigo, Boumchita, Chpigarel, Mafroune, Manfroune.*
Pageot commun	*Pageot, el bejjij.*
Pagre	*Al-baghar, Pagre, Pagré, Pagri, Pray.*
Pagre rayé	*Pagre, Pagre rayé.*
Palomette	*Palomète.*
Palomine	*Chèvre, Etoile, Palimia, Paromila.*
Petite rascasse	*Rascassa, Rascasse.*
Petite sole jaune	*Requiqua, Sola, Sole.*
Petite vive	*Allafaa, Araignée, Ragnie, Rania.*
Phycis de fond	*Mostela, Moustelle, Mystelle, Makala.*
Phycis de roche	*Mostela, Moustelle, Mystelle, Makala.*
Picarel	*Kârous, Schpidue, Tchoukla, Tchucla.*
Picarel guetteur	*Bogga elhamra, Cigarette.*
Plagusie sombre	*Sole.*
Poisson-lézard	*Aharbabou, Lézard, Zermmoumia.*
Poisson-lune	*Mola, Poisson-lune, Poisson-soleil.*
Poisson-pilote	*Poisson pilote.*

R

Rascasse brune	*Rascassa, Rascasse.*
Rascasse de fond	*Hmam el bhar, Maaza, Rascassa, Rascasse.*
Rascasse rose	*Rascassa, Rascasse.*

Rascasse rouge	*Rascassa, Rascasse.*
Razon	*Epingle, Mechta, Rason, Rasoul.*
Rombo	*Hebo, Rambo, Rumbo, Sole.*
Rouget barbet de roche	*Mlal el hadjra, Rocca, Rouget, Rougi.*
Rouget barbet de vase	*Mlal el khaz, Rouget, Rougi, Salmoneté.*

S

Saint-Pierre	*Hout Sidna Souleimane, Saint-Pierre, San-Pedro.*
Sanglier	*Pech-trompette, Poisson-trompette, Sanglier, Tachaco.*
Sar à grosses lèvres	*Sargo, Sar.*
Sar à museau pointu	*Shaghre, Sar.*
Sar à tête noire	*Bidrilla, Sar, Sargo, Sparle.*
Sar Commun	*Al khantchour, Bousnane, Sargo, Sparle Tambour, Sar.*
Sardine	*Serdine.*
Saupe	*Chelba, Salpa, Saupe, Tchelba, Tchelbine.*
Seriole couronnée	*Lichola, Limon, Lintchol, Pech-limon.*
Serpenton à nez long	*H'nech, Serpent de mer.*
Serpenton miro	*H'nech, Serpent de mer.*
Serran à queue noire	*Sarrano, Serranow, Serran, Serran-Zalamite.*
Serran-chèvre	*Sarrano, Serranow, Serran, Serran-zalamite.*
Serran-écriture	*Sarrano, Serranow, Serran, Serran-zalamite.*
Serran-tambour	*Castagnole rouge, Sarrano, Serdouk, Serran.*
Sole commune	*Sole, Sola, Pilova.*
Sole de mer Egée	*Sole.*
Sole tachetée	*Sole.*
Sole-perdrix commune	*Sole.*
Sole-perdrix juive	*Linguao, Sole.*
Sparaillon commun	*Raspaillon, Sar, Sargo, Sparaillon, Sparle.*

T

Tassergal	*Assera, Poisson-serre, Serra.*
Thon rouge	*Than, Thon, Thona.*
Thonine	*Albaguore, Bacorète, Thonine.*
Turbot	*Bourrourrou, Corbeau, Hebo, Turbot.*

U

Uranoscope	*Albouma, Bouledogue, Madame François, Rascasse blanche, Toppa.*

V

Vive à tête rayé	*Allafaa, Araignée, Ragnia, Rania.*
Vive-araignée	*Allafaa, Araignée, Ragnia, Rania.*

BIBLIOGRAPHIE

ABADA M., BOULASSEL S., 1992. La Pêche à El-Kala.
– Etude statistique des mises à terre et détermination du niveau d'exploitation de quelques espèces cibles.
– Données préliminaires sur le corail rouge "*Corallium rubrum* L., 1758". Mémoire d'Ingénieur d'Etat en Helieutique ISMAL - Alger.

ALILI D.E, 1988. Contribution à la systématique des Soleidés (Poissons Téléostéens) d'Algérie.
Taxinomie numérique et génétique biochimique.
Thèse de Magister, USTHB (Alger) : 203 p.

ARRIGNON J., 1976. Aménagement écologique et piscicole des eaux douces, 3° édition. Ed. Gauithier-Villars, Paris 304 p.

BABOURI R., 1990. Quelques éléments sur la reproduction et la croissance de *Mullus barbatus* (Linné, 1758) dans la golfe de Béjaia. Mémoire de DES.ISMAL : 122 p + annexes.

BAUCHOT M.L., PRAS A., 1980. Guide des poissons marins d'Europe.Ed. Delachaux et Niestlé, Paris : 427 p.

BELKESSAM D., ISSOLAH F., 1991. La pêche chalutière au port de Bou-Haroun : étude statistique des débarquements et aperçu sur quelques paramètres biologiques et dynamiques d'espèces cibles.
Mémoire d'Ingénieur d'Etat. ISMAL (Alger) : 96 p. + Annexes.

BOUGIS P., 1977. Je reconnais les poissons marins. Tome I. A la pêche. Collection "agir et connaître" : Germain : 144 p.

CHALI-CHABANE F., 1988. Contribution à l'étude biologique et dynamique de la population de bogues : *Boops boops* (Linné, 1758) de la baie de Bou-Ismail.
Thèse de Magister, ISMAL (Alger) : 110 p.

CHERABI O., 1987. Contribution à l'étude du pageot : *Pagellus erythrinus* (Linné, 1758) et à l'écologie de la famille des Sparidés de la baie d'Alger.
Thèse de Magister, USTHB (Alger) : 138 p.

DERDICHE O., DJEKRIR F., STAMBOULI A., 1990. La pêche à Béni-Saf : "Stratégie d'échantillonnage des mises à terre et estimation du niveau d'exploitation de la pêcherie chalutière.
Mémoire d'Ingénieur d'Etat, ISMAL (Alger) : 210 p.

DIEUZEIDE R., NOVELLA M., ROLAND J., 1955. Catalogue des poissons des côtes algériennes.- Osteopterygiens. Vol III.
Bull. Stat. Aquac. pêches. Castiglione : 384 p.

DIEUZEIDE R., NOVELLA M., ROLAND J., 1959. Catalogue des poissons des côtes algériennes. Osteopteygiens Vol II. 2éme édition. Bull. Stat. Aquac. Pêches. Castiglione : 300 p.

FISCHER W., BAUCHOT M.L., SCHNEIDER M., 1987. Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche (Révision 1). Méditerranée et mer Noire.
Zone de pêche 37. Volume I. Végétaux et invertébrés.
FAO. Vol. 1 : 760 p.

FISCHER W., BAUCHOT M.L., SCHNEIDER M., 1987. Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche (révision 1). Méditérrannée mer Noire.
Zone de pêche 37. Volume II. Vertébrés.
FAO. Vol. 2 : 761-1530.

FREDJ G., MAURIN C., 1987. Les poissons dans la banque des données Médifaune. Application à l'étude des caractères de la faune ichthyologique méditerranéenne. CYBIUM, vol. 11 (3) : 219-341.

HABIB A., KOUDIL M., 1990. La pêche au chalut et à la senne au port d'Alger. Etude statistique des mises à quai et détermination du niveau d'exploitation de quelques espèces cibles.
Mémoire d'Ingénieur d'Etat. ISMAL (Alger) : 145 p.
+ annexes.

HARCHOUCHE K., 1988. Contribution à l'étude de la biologie et de l'écologie d'une espèce de Sparidés dans la baie d'Alger : "le pageot blanc" *Pagellus acarne* (Risso, 1826).
Thèse de Magister, USTHB (Alger) : 170p

HARIR T., FLITI K., SARI A., 1992. La pêche à GHazaouet : étude statistique des mises à terre et détermination du niveau d'exploitation de quelques espèces cibles.
Mémoire d'Ingénieur d'Etat : ISMAL (Alger).

HEMIDA F., 1987. Contribution à l'étude de l'anchois *Engraulis encrasicolus* (Linné, 1758) dans la région d'Alger : Biologie et exploitation.
Thèse de Magister, USTHB (Alger) : 138 p.

HUREAU J.C., MONOD T., 1978. Catalogue des poissons de l'Atlantique du nord-est et de la Méditerranée. CLOFNAM I. UNESCO : 683 p.

HUREAU J.C., MONOD T., 1978. Catalogue des poissons de l'Atlantique du nord-est et de la Méditerranée. CLOFNAM II. UNESCO : 394 p.

HUSON R., 1970. Glossaire de biologie animale. Ed. Gauthier-Villars, Paris : 293 p.

ISTPM, 1982. Evaluation des ressources halieutiques de la marge continentale algérienne. Stocks pélagiques, stocks démersaux, exploitation au chalut : Campagne Thalassa, Ichthys-Joamy : 101 p.

KARTAS F., 1981. Les Clupeidés de Tunisie. Caractéristiques biométriques et biologiques. Etude comparée des populations de l'Atlantique et de la Méditerranée. Thèse de Doct. Etat. Faculté des Sciences de Tunis : 608 p.

KORICHI H.S, 1988. Contribution à l'étude biologique de saurels : *Trachurus trachurus* (Linné, 1758) et *Trachurus mediterraneus* (Steindachner, 1868) et de la dynamique de *Trachurus trachurus* (Linné, 1758) en baie de Bou-Ismail (Alger). Thèse de Magister, ISMAL (Alger) : 260 p. annexes.

LALAMI Y., 1971. Contribution à l'étude systématique, biologique, écologique et statistique des poissons de la pêcherie d'Alger. Pélagos 3 (4) : 150 p.

LAOUAR STAHI S., SAMAR S., 1990. La pêcherie chalutière de la région de Annaba : Analyse statistique des mises à terre et appréciation du niveau d'exploitation d'espèces cibles. Mémoire d'Ingénieur d'Etat. ISMAL (Alger) : 99 p. annexes.

LUCAS A., 1981. Les invertébrés : Eléments de systématique zoologique. Faculté des Sciences et Technique de Brest : 73 p.

MOUHOUB R., 1986. Contribution à l'étude de la biologie et de la dynamique de la population exploitée de la sardine *(Sardina pilchardus*, Walbaum 1792) des côtes algéroises. Thèse de Magister, USTHB : 163 p.

WHITEHEAD P. J.P. et al, 1986. Poissons de l'Atlantique du nord-est et de la Méditerranée. UNESCO. Vol. II. 517.10007.

WHITEHEAD P.J.P. et al., 1986. Poissons de l'Atlantique du nord-est et de la Méditerrannée. UNESCO. Vol. III : 1015-1473.

ZANAT B., 1988. Notes sur quelques paramètres biologiques et dynamiques de la population de rouget de roche *(Mullus surmuletus,* Linné, 1758) de la région d'Alger.
Mémoire d'Ingénieur d'Etat, ISMAL (Alger) : 122 p.

IMPRIMERIE OFFICIELLE
7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - ALGER
Tél. : 65.18.15. à 17 — Fax : 66.01.11
— Télex : 65 180 IMPOF DZ

Illustrations : Autorisation de reproduction - F.A.O. N °A 51/91.